

Entzündete Augen

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Wann wird SIMILASAN Entzündete Augen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann SIMILASAN Entzündete Augen angewendet werden bei leichten Formen von:

- Entzündeten, geröteten Augen
- Lidrandentzündungen
- Brennenden Augen
- Lichtempfindlichkeit

Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine ärztliche Behandlung angezeigt.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SIMILASAN Entzündete Augen gleichzeitig angewendet werden darf. Bei Augenentzündungen ist das Tragen von Kontaktlinsen nicht angezeigt.

Wenn Sie jedoch auf Kontaktlinsen angewiesen sind, entfernen Sie diese vor dem Eintropfen und setzen Sie die Linsen frühestens

15 Minuten nach der Behandlung wieder ein. Empfehlenswert ist die Anwendung auch nach dem Entfernen der Linsen, abends vor dem Schlafengehen und morgens beim Erwachen, mind. 15 Min. vor dem Einsetzen der Linsen.

Beachten Sie, dass ein entzündetes Auge gegenüber Linsen empfindlicher reagiert.

Wenn nach 2–3 Tagen keine Besserung eingetreten ist, ist ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Kommt es zu einer Verschlechterung oder treten neue Symptome auf, z. B. eine Abnahme der Sehschärfe oder Schmerzen, ist unverzüglich ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wann darf SIMILASAN Entzündete Augen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Bei Säuglingen und Kindern bis 6 Jahre nur auf ärztliche Verschreibung hin anwenden.
- Für Säuglinge und Kleinkinder sollen ausserdem

die Konservierungsmittelfreien Monodosen verwendet werden.

- Bei Linsenrührung (Grauer Star, Katarakt) oder Grünem Star (Glaukom) nur nach ärztlicher Diagnose anwenden.
- SIMILASAN Entzündete Augen darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen der verwendeten Hilfsstoffe.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an andere Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen oder anwenden.

Darf SIMILASAN Entzündete Augen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt.

Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie SIMILASAN Entzündete Augen?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

- Ein bis mehrere Male pro Tag 1–2 Tropfen pro Auge.

Anwendung:

- Gummiteil des Ausgusses mit zwei Fingern zusammendrücken und Tropfen ins Auge träufeln.
- Berühren der Gummispitze mit den Fingern und direkter Kontakt mit dem Auge ist zu vermeiden.
- Nach Gebrauch sofort verschliessen!

Die Wirkdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Anwendung des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung.

Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann SIMILASAN Entzündete Augen haben?

Für SIMILASAN Entzündete Augen wurden in

Einzelfällen allergische Reaktionen mit Juckreiz, Brennen und Rötung der Augen beobachtet. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren. Bei der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Massnahmen im Falle von anfänglicher Symptomverstärkung (Erstverschlimmerung):

1. Präparat nicht mehr anwenden bis die Reaktion abgeklungen ist.
2. Einmal 1 Tropfen in ein Auge träufeln. Wirkung abwarten.
3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.
4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfehlungen unter "Wie verwenden Sie ..." einhalten.

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SIMILASAN Entzündete Augen ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

- Ausser Reichweite von Kindern lagern.
- Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit <EXP> bezeichneten Datum verwendet werden.
- Das Präparat darf nach Anbruch des Fläschchens nicht länger als 3 Monate verwendet werden.
- Bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in SIMILASAN Entzündete Augen enthalten?

1 g Tropflösung enthält: Belladonna (Atropa bella-donna) D6 / Euphrasia 3c D6 / Hepar sulfuris D12 zu gleichen Teilen 303 mg. Dieses Präparat enthält als zusätzliche Hilfsstoffe: Wasser; Tonisierungs- und Pufferungsmittel: Natriumnitrat, Borax, Borsäure; Konservierungsmittel: Silbersulfat

Zulassungsnummer

60381 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie SIMILASAN Entzündete Augen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

- Fläschchen zu 10 ml
- Auch als Packungen mit 20 Einzeldosen zu 0,40 ml (ohne Konservierungsmittel) erhältlich.

Zulassungsinhaber

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Diese Packungsbeilage wurde im März 2017 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Yeux enflammés

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand SIMILASAN Yeux enflammés est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique SIMILASAN Yeux enflammés peut être utilisé en cas de:

- Yeux enflammés, rouges
- Lisières de paupières irritées
- Yeux qui brûlent
- Sensibilité à la lumière

Un traitement médical est indiqué en cas de formes graves de ces maladies.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN Yeux enflammés peut être utilisé simultanément. En cas d'inflammation des yeux, il n'est pas recommandé de porter des verres de contact. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous en passer, retirez-les avant de mettre les gouttes et remplacez vos verres de contact au plus tôt 15 minutes après le traitement. L'utilisation est également conseillée le soir, après le retrait des lentilles, avant d'aller se coucher et le matin au réveil, au moins 15 minutes avant de les remettre. N'oubliez pas qu'un oeil irrité réagira de manière beaucoup plus sensible aux verres de contact. Si aucune amélioration ne devait intervenir après 2 à 3 jours, il est recommandé de consulter un médecin. Si l'état devait même se détériorer ou si de nouveaux symptômes devaient apparaître, p.ex. baisse de l'acuité visuelle ou des douleurs, il y aurait lieu de consulter immédiatement un médecin.

Quand SIMILASAN Yeux enflammés ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

- A utiliser uniquement sur ordonnance chez les nourrissons et les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans.
- Utiliser en outre les monodoses sans conservateur pour les nourrissons et les enfants en bas âge.

- A utiliser uniquement après un avis médical en cas d'opacification du cristallin (cataracte) ou de glaucome.
- SIMILASAN Yeux enflammés ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'un des excipients employés.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

SIMILASAN Yeux enflammés peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser SIMILASAN Yeux enflammés?

Sauf prescription contraire du médecin:

- 1–2 gouttes par oeil, une à plusieurs fois par jour.

Application:

- Presser avec deux doigts la partie caoutchouc du bec et faire tomber la goutte dans l'oeil.
- Ne pas toucher la pointe en caoutchouc avec les doigts et éviter le contact avec l'oeil.
- Refermer immédiatement après l'emploi!

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou les troubles reviennent. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires SIMILASAN Yeux enflammés peut-il provoquer?

Des cas isolés de réactions allergiques avec démangeaisons, sensation de brûlure et rougeur des yeux ont été observés avec SIMILASAN Yeux enflammés. Si vous remarquez des effets secondaires

qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement (aggravation initiale):

1. suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Faire tomber une goutte dans un oeil. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous „Comment utiliser ...“.

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN Yeux enflammés et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

- Conservez hors de portée des enfants.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.
- Une fois le flacon ouvert, la préparation ne devra pas être utilisée pendant plus de 3 mois.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient SIMILASAN Yeux enflammés?

1 g de solution contient: Belladonna (Atropa bella-donna) D6 / Euphrasia 3c D6 / Hepar sulfuris D12 à parts égales 303 mg. Ce produit contient des additifs: eau; produit tonifiant et neutralisant: nitrate de sodium, borax, acide borique; agent conservateur: sulfate d'argent.

Numéro d'autorisation

60381 (Swissmedic)

Où obtenez-vous SIMILASAN Yeux enflammés? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

- Flacon de 10 ml
- Egalement disponible sous forme d'emballage de 20 doses individuelles de 0,40 ml (sans agent de conservation).

Titulaire de l'autorisation

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2017 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Occhi infiammati

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa SIMILASAN Occhi infiammati ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici SIMILASAN Occhi infiammati può essere usato in caso di:

- Infiammazioni, occhi arrossati
- Orli delle palpebre infiammate
- Bruciore agli occhi
- Ipersensibilità alla luce

In caso di forme gravi di queste patologie, si consulti un medico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento ?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare SIMILASAN Occhi infiammati.

Si sconsiglia di portare le lenti a contatto in caso d'infiammazioni agli occhi. Qualora tuttavia non si possa far a meno delle lenti a contatto, toglierle prima di instillare il collirio e rimettere non prima che siano trascorsi almeno 15 minuti dall'istillazione.

Si consiglia l'uso anche dopo aver tolto le lenti di sera prima di andare a dormire e di mattina al risveglio, almeno 15 minuti prima di mettere le lenti. Si tenga presente che quando l'occhio è infiammato reagisce alle lenti con maggiore sensibilità. Rivolgersi ad un medico se non si osserva alcun miglioramento apprezzabile nel giro di 2-3 giorni. Consultare immediatamente il medico qualora si noti un peggioramento o la comparsa di nuovi sintomi, per es. una diminuzione dell'acuità visiva o dolori.

Quando non si può usare SIMILASAN Occhi infiammati e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Usare nei neonati e nei bambini fino a 6 anni solo su prescrizione medica.
- Per i neonati e i bambini piccoli usare inoltre il prodotto privo di conservanti in contenitore monodose.

- In caso di offuscamento del cristallino (cataratta) o glaucoma usare soltanto dopo la diagnosi medica.
- SIMILASAN Occhi infiammati non deve essere usato in caso di ipersensibilità nota a una delle sostanze ausiliarie utilizzate.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o, assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può usare SIMILASAN Occhi infiammati durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN Occhi infiammati?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

- Da una a più volte il giorno, 1-2 gocce in ogni occhio.

Applicazione:

- Premere con due dita sul beccuccio di gomma e far cadere le gocce negli occhi.
- Non toccare la punta con le dita ed evitare il contatto diretto con l'occhio.
- Chiudere immediatamente la boccetta dopo l'uso!

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere l'uso del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Occhi infiammati?

In casi isolati, con SIMILASAN Occhi infiammati sono state osservate reazioni allergiche con prurito, bruciore e arrossamento degli occhi.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano (peggioramento iniziale):

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Istillare in una volta sola 1 goccia in 1 occhio e aspettare la reazione.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come usare...".

Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Occhi infiammati e informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con <EXP> sul contenitore.
- Utilizzare il preparato entro 3 mese dall'apertura del flacone.
- Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Il medico, il farmacista o il droghiere, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN Occhi infiammati?

1 g di soluzione contiene: Belladonna (Atropa belladonna) D6 / Euphrasia 3c D6 / Hepar sulfuris D12 in parti uguali 303 mg. Questo preparato contiene come sostanze ausiliarie supplementari: acqua; sostanza tonizzante e tampone: nitrato di sodio, borace, acido bórico; conservante: solfato di argento.

Numero dell'omologazione

60381 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Occhi infiammati? Quali confezioni sono disponibili?

- In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica.
- Flacone da 10 ml
- Disponibile anche in confezione con 20 monodose da 0,40 ml (senza conservanti).

Titolare dell'omologazione

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2017 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Inflamed Eye

Information for patients

Read this package leaflet carefully since it contains important information. This medicine has either been prescribed for you personally by your doctor, or you have purchased it from a pharmacist or druggist without a medical prescription. In order to obtain the greatest benefit from this medicine, use it according to this package leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or druggist. Keep this package leaflet safe, you may want to read it again later.

When should SIMILASAN Inflamed Eye be used ?

In accordance with homeopathic principles, SIMILASAN Inflamed Eye can be used for mild forms of:

- Inflamed, red eyes
- Inflamed eyelids
- Burning eyes
- Sensitivity to light

For severe forms of these conditions medical treatment is advised.

What precautions should be taken?

If your physician has prescribed other medications, please ask him/her or your pharmacist if you may use SIMILASAN Inflamed Eye at the same time. In cases of inflammation of the eye, the wearing of contact lenses is not advised. However, if you are dependent upon contact lenses, remove these before using the eye drops and replace the lenses at the earliest 15 minutes after treatment. You are also recommended to use this product after taking out your contact lenses, in the evening before going to bed and in the morning upon waking, at least 15 minutes before putting your contact lenses in. Please note that inflamed eyes react more sensitively to contact lenses. If the eye inflammation does not improve after 2-3 days, consult your doctor. Should the condition worsen or new symptoms occur, such as blurry vision or pain, consult your doctor immediately.

When must SIMILASAN Inflamed Eye not be used or used only with caution?

- Only use in infants and children up to age 6 if prescribed by a doctor.
- In addition, the preservative-free monodoses should be used in infants and young children.
- If you have cataracts or glaucoma only use after a medical diagnosis.

- SIMILASAN Inflamed Eye should not be used in cases of known hypersensitivity to any of the excipients used.

Tell your doctor, pharmacist or druggist if you are suffering from any other diseases or illnesses, have allergies or are taking other medicines (even those you have bought yourself) by mouth or using them externally.

When must SIMILASAN Inflamed Eye not be taken during pregnancy or when breast-feeding?

Experience so far shows that there is no known risk to the unborn child when used as recommended. However, systematic scientific studies have never been performed. As a precautionary measure, you are advised to refrain from taking medications during pregnancy and while breast-feeding or to consult your physician, pharmacist or druggist.

How do you use SIMILASAN Inflamed Eye?

Unless prescribed differently by your physician:

- Drip 1-2 drops in each eye once or several times a day.

Instructions for administration:

- Squeeze rubber dropper between thumb and forefinger and drip in the eye.
- Avoid touching the rubber tip with your fingers, and do not let the tip touch eyes.
- Replace cap on bottle immediately after use!

The period of effectiveness of a medical preparation can vary from person to person.

As a rule, repeat the dose when the effect wears off or the symptoms recur. Keep to the dosage given in the package leaflet or prescribed by your doctor.

If no improvement is seen in a child, seek the advice of a doctor.

If you think that the medicine is working too little or too strongly, talk to your doctor, pharmacist or druggist.

What side effects can SIMILASAN Inflamed Eye have?

Isolated cases of allergic reactions, with itching, burning and reddening of the eyes, have been observed with SIMILASAN Inflamed Eye. Tell your doctor, pharmacist or druggist if you notice any side effects not described here.

When using homeopathic medication, the symptoms present may at first become more pronounced for a short period (initial exacerbation).

Measures to take in the case of initial worsening of symptoms (initial exacerbation):

1. Stop using the preparation until the reaction has ceased.
2. Drip 1 drop in one eye and wait for reaction.
3. If the reaction recurs, proceed as described in 1. and 2. above.
4. If the reaction does not recur, follow the instructions mentioned in "How do you use ...".

Should the worsening of symptoms persist, stop using SIMILASAN Inflamed Eye and inform your physician, pharmacist or druggist.

What should also be taken into consideration?

- Keep out of the reach of children.
- The medication may only be taken until the expiry date marked <Exp.> on the container.
- This medication may only be used for 3 months after breaking the seal of the applicator.
- Store at room temperature (15-25 °C).

Further information can be obtained from your physician, pharmacist or druggist.

What does SIMILASAN Inflamed Eye contain?

1 g solution contains: Belladonna (Atropa belladonna) D6 / Euphrasia 3c D6 / Hepar sulfuris D12 in equal proportions 303 mg.

As additional excipients, this product contains: water; osmotic adjuster and buffering agent: sodium nitrate, borax, boric acid; preservative: silver sulphate.

Product licence No.:

60381 (Swissmedic)

Where can you obtain SIMILASAN Inflamed Eye? How is the preparation presented?

In pharmacies and drugstores, without medical prescription.

- Bottle of 10 ml
- Also available in packs of 20 single-doses, 0,40 ml each (contains no preservatives).

Holder of product licence:

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

The latest examination of this package leaflet was carried out in March 2017 by the Swiss Federal Authorities for Medication (Swissmedic).