

# Similasan

## Pharmacie de poche

Médicaments homéopathiques

### Sommaire

	Page		Page
• Affections cutanées	2	• Hémorroïdes	10
• Arnica plus	3	• Inflammations de la gorge	11
• Coliques nerveuses	4	• Rhume liquide	12
• Constipation	5	• Toux grasse	13
• Formation du lait maternel	6	• Toux irritative	14
• Grippe et la fièvre No. 1 (Frissons et bouffées de chaleur, membres douloureux)	7	• Troubles de dentition	15
• Grippe et la fièvre No. 2 (Fortes sueurs, irritabilité générale)	8	• Troubles du sommeil	17
		• Troubles veineux	18
		• Voies digestives	19

# SIMILASAN

## Affections cutanées

### Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### Quand SIMILASAN affections cutanées est-il utilisé ?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN affections cutanées peut être utilisé en cas d'affections cutanées et d'eczémas comme :

- Erythème ou eczéma sec, squameux ou suintant
- Plaque enflammée et érythème avec rougeurs
- Urticaire, enflure
- Eruption de vésicules

### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN affections cutanées peut être pris simultanément.

### Quand SIMILASAN affections cutanées ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

- Ne doit pas être utilisé pour les enfants de moins de 2 ans que sur les prescriptions du médecin ou du pharmacien, de la pharmacienne
- Un médecin doit être consulté lors d'altérations de la peau sur de grandes surfaces, lors d'infections et en cas de suspicion de maladies systémiques.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique,
  - vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication).

### Comment utiliser SIMILASAN affections cutanées ?

Si votre médecin n'a pas fait une autre prescription :

Bébés, enfants et adultes :

3 fois par jour 7 globules.

### Mode d'emploi :

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre.

C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

### Quels effets secondaires SIMILASAN affections cutanées peut-il provoquer ?

Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour SIMILASAN affections cutanées. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

### Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement :

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre en une fois 7 globules.  
Attendre la réaction.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous « Comment utiliser ... ».

Si l'aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN affections cutanées et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### A quoi faut-il encore faire attention ?

- Sans sucre. Avec xylite.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date indiquée sur le récipient par la mention < Exp. >.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25° C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### Que contient SIMILASAN affections cutanées ?

Les globules contiennent : Mercurius solubilis Hahnemannii D12 / Natrium muriaticum (Natrium chloratum) D12 / Rhus toxicodendron D10 / Selenium D15 à parts égales.

La préparation contient en tant qu'excipients : xylite et carbonate de calcium.

### Numéro d'autorisation :

50884 (Swissmedic)

### Où obtenez-vous SIMILASAN affections cutanées ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements : 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

## Titulaire de l'autorisation :

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en février 2009.

# SIMILASAN Arnica plus

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Quand SIMILASAN Arnica plus est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, SIMILASAN Arnica plus peut être utilisé en cas de foulures, entorses, luxations, contusions, hématomes, blessures aux endroits sensibles (coupures, piqûres), douleurs musculaires (crampes), brûlures, coups de soleil, troubles postopératoires (douleurs liées à la plaie), troubles après fractures.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

## De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Les plaies étendues, profondes et très souillées, ainsi que les morsures et les piqûres, exigent un traitement médical (risque de tétanos). De même, une consultation médicale s'impose si une plaie ne régresse pas au bout de quelque temps ou en cas de non-cicatrisation dans les 7 jours. Consulter également le médecin si les bords de la plaie sont fortement rougis, si elle enfle brusquement, si elle est très douloureuse ou si elle s'accompagne de fièvre (risque de septicémie).

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN Arnica plus peut être pris simultanément.

## Quand SIMILASAN Arnica plus ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à Arnica montana (arnica), Calendula officinalis (souci) ou d'autres composacées (asteracées) (p. ex. Achillea millefolium [millefeuille], armoise, etc.).

En cas d'aggravation générale (p.ex. fièvre) un médecin doit immédiatement être consulté.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

## SIMILASAN Arnica plus peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

## Comment utiliser SIMILASAN Arnica plus ?

Si votre médecin n'a pas fait une autre prescription : Enfants (âgés de plus de 2 ans), adolescents et adultes : 7 globules par prise.

- **Troubles aigus :** 6 fois par jour, plus souvent en cas de violents douleurs (voire toutes les demi-heures).
- **Pour parachever la guérison :** 3 fois par jour.

## Mode d'emploi :

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou les troubles reviennent.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

## Quels effets secondaires SIMILASAN Arnica plus peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN Arnica plus et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de SIMILASAN Arnica plus n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

## À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

### Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

### Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

## Que contient SIMILASAN Arnica plus ?

1 g de globules contient :

### Principes actifs

Arnica montana (HAB) D4 2.500 mg / Calendula officinalis

(HAB) D4 2.500 mg / Hypericum perforatum (HAB) D4

2.500 mg / Symphytum officinale (HAB) D6 2.500 mg.

### Excipients

Calcii carbonas; Xylitololum (E 967)

1 g correspond à 70–90 globules

## Numéro d'autorisation

51362 (Swissmedic)

## Où obtenez-vous SIMILASAN Arnica plus ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage et de la pharmacie de poche)

## Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

## Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

# SIMILASAN Coliques nerveuses

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Quand SIMILASAN coliques nerveuses est-il utilisé ?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique, SIMILASAN coliques nerveuses peut être utilisé en cas de :

- Spasmes gastriques et intestinaux suite à un état de nervosité ou de troubles psychiques
- Troubles digestifs d'origine nerveuse accompagnés de ballonnements de spasmes et de coliques
- Spasmes des voies biliaires et de la vésicule biliaire

## De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

- En cas d'aggravation des troubles, de température élevée ou si aucune amélioration n'intervient en l'espace d'une semaine, consulter votre médecin.
- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si SIMILASAN coliques nerveuses peut être pris simultanément.

## Quand SIMILASAN coliques nerveuses ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

- Les troubles de la digestion des enfants de moins de 12 ans doivent faire l'objet d'une exploration médicale. Pour cette raison, cette préparation ne doit pas être administrée aux enfants de moins de 12 ans sans exploration médicale préalable.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique,
  - vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

## Comment utiliser SIMILASAN coliques nerveuses ?

Sauf prescription contraire du médecin :

Bébés, enfants et adultes: 7 globules par prise.

- Troubles aigus: Tous les quarts ou toutes les demi-heures. Réduire la fréquence au fur et à mesure de l'amélioration des troubles.
- Pour parachever la guérison : 3 fois par jour, jusqu'à disparition complète des troubles.

## Mode d'emploi :

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

## Quels effets secondaires SIMILASAN coliques nerveuses peut-il provoquer ?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour.

# SIMILASAN Constipation

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

## Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement :

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre une fois 7 globules. Attendre la réaction.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous « Comment utiliser ... ».

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN coliques nerveuses et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## A quoi faut-il encore faire attention ?

- Sans sucre. Avec xylite.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention < Exp. > sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25° C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## Que contient SIMILASAN coliques nerveuses ?

Les globules contiennent: Anamirta cocculus D15 / Belladonna (Atropa bella-donna) D12 / Chamomilla recutita D12 / Colocynthis D12 / Magnesium phosphoricum D12 à parts égales. La préparation contient en tant qu'excipients: xylite et carbonate de calcium.

## Numéro d'autorisation :

52311 (Swissmedic)

## Où obtenez-vous SIMILASAN coliques nerveuses ?

### Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.  
Conditionnements : 15 g  
4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

## Titulaire de l'autorisation :

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en février 2009.

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Quand SIMILASAN Constipation est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, SIMILASAN Constipation peut être utilisé en cas de constipation (chronique, avec crampes), paresse intestinale, selles dures. L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

## De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

En cas de constipation rebelle ou chronique, un succès n'intervient souvent qu'au bout de 4 à 6 semaines de traitement. En cas de constipation, il est important de boire abondamment, de consommer des aliments riches en fibres (légumes, fruits, pain complet) et de faire de l'exercice physique (sport). Si l'état empire ou si l'amélioration tarde, consulter le médecin. Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN Constipation peut être pris simultanément.

## Quand SIMILASAN Constipation ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Chez les enfants de moins de 12 ans, la constipation et/ou la paresse intestinale doivent être examinées par un médecin. La préparation ne doit donc pas être utilisée sans consultation médicale chez les enfants de moins de 12 ans.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

## SIMILASAN Constipation peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

## Comment utiliser SIMILASAN Constipation ?

Si votre médecin n'a pas fait une autre prescription:

Adolescents à partir de 12 ans et adultes:

7 globules (granules) par prise.

- **Troubles aigus:** 3 fois par jour.
- **Pour parachever la guérison:** 1 fois par jour (matin ou soir).

Pour les enfants âgés de moins de 12 ans, le dosage de SIMILASAN Constipation doit se faire conformément aux instructions du médecin et/ou après consultation médicale.

### Prescription d'absorption:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin.

Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

### Quels effets secondaires SIMILASAN Constipation peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN Constipation et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de SIMILASAN Constipation n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

### À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

#### Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

#### Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

### Que contient SIMILASAN Constipation ?

1 g de globules contient:

#### Principes actifs

Graphites (HAB) D12 2.500 mg / Magnesium chloratum (HAB) D8 2.500 mg / Sulfur (HAB) D15 2.500 mg / Thuja occidentalis (HAB) D10 2.500mg.

#### Excipients

xylite (E967) 600 mg et carbonate de calcium

1 g correspond à 70–90 globules

### Numéro d'autorisation

51373 (Swissmedic)

### Où obtenez-vous SIMILASAN Constipation ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

### Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jönen

### Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

## SIMILASAN Formation du lait maternel

### Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### Quand SIMILASAN formation du lait maternel est-il utilisé ?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN formation du lait maternel peut être utilisé en cas de:

- Manque de lait chez la mère allaitante et pour stimuler la montée du lait

### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN formation du lait maternel peut être pris simultanément.

### Quand SIMILASAN formation du lait maternel ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

- Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique,
  - vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication).

## Comment utiliser SIMILASAN formation du lait maternel ?

Sauf prescription contraire du médecin:

Important manque de lait, montée de lait très tardive:

7 globules 6 fois par jour

Optimisation et maintien de la quantité de lait:

7 globules 2 - 3 fois par jour

### Mode d'emploi:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou les troubles reviennent.

Durée du traitement: En cas de besoin pendant toute la durée de l'allaitement.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

### Quels effets secondaires SIMILASAN formation du lait maternel peut-il provoquer ?

Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour SIMILASAN formation du lait maternel.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

### Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement:

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre en une fois 7 globules. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous „Comment utiliser ...”.

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN formation du lait maternel et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### A quoi faut-il encore faire attention ?

- Sans sucre. Avec xylite.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention < Exp. > sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## Que contient SIMILASAN formation du lait maternel ?

Les globules contiennent: Alfalfa D6 / Lac caninum D10 / Urtica urens D6 à parts égales.

La préparation contient en tant qu'excipients xylite et carbonate de calcium.

### Numéro d'autorisation:

54925 (Swissmedic)

### Où obtenez-vous SIMILASAN formation du lait maternel ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

### Titulaire de l'autorisation:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en février 2009.

# SIMILASAN Grippe et la fièvre No. 1

### Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### Quand SIMILASAN grippe et fièvre No.1 est-il utilisé ?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN grippe et fièvre No.1 peut être utilisé en cas de :

- Refroidissements naissants ou aigus, avec fièvre et toux
- Grippe et refroidissement avec membres douloureux et grande lassitude
- Grippe et refroidissement avec frissons et bouffées de chaleur alternant
- Grippe et refroidissement avec tête chaude et céphalées (front et joues en feu)

### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

- En cas de fièvre élevée ou en cas d'aggravation de l'état général, consulter rapidement le médecin.
- Il est recommandé de prendre la préparation le plus tôt possible, c'est à dire lors de l'apparition des premiers signes d'un refroidissement (douleurs dans les muscles, frissons et bouffées de chaleur, fatigue).

- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN grippe et fièvre No.1 peut être pris simultanément.
- Si l'état empire ou si l'amélioration tarde, consulter le médecin.

### **Quand SIMILASAN grippe et fièvre No.1 ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec des précautions ?**

- Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique,
  - vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication)

### **Comment utiliser SIMILASAN grippe et fièvre No.1 ?**

Si votre médecin n'a pas fait une autre prescription :

Bébés, enfants et adultes : 7 globules par prise.

- Aux premiers symptômes de grippe ou refroidissement : 3 – 6 fois par jour.
- Troubles aigus : Toutes les demi-heures. Réduire la fréquence au fur et à mesure de l'amélioration des troubles.
- Pour parachever la guérison : 3 fois par jour.

### **Mode d'emploi :**

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge/de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

### **Quels effets secondaires SIMILASAN grippe et fièvre No.1 peut-il avoir ?**

Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour SIMILASAN grippe et fièvre No.1.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

### **Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement :**

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.

2. Prendre une fois 7 globules. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous « Comment utiliser ... ».

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN grippe et fièvre No.1 et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **A quoi faut-il encore faire attention ?**

- Sans sucre. Avec xylite.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date indiquée sur le récipient par la mention <Exp.>.
- Conserver à température ambiante entre 15 – 25° C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### **Que contient SIMILASAN grippe et fièvre No.1 ?**

Les globules contiennent : Ferrum phosphoricum D6 60 % / D8 20 % / D12 20 %.

La préparation contient en tant qu'excipients : xylite et carbonate de calcium

### **Numéro d'autorisation :**

53322 (Swissmedic)

### **Où obtenez-vous SIMILASAN grippe et fièvre No.1 ?**

#### **Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?**

En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale.  
Conditionnements : 15 g  
4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

### **Titulaire de l'autorisation :**

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic) en février 2009.

## SIMILASAN Grippe et la fièvre No. 2

### **Information destinée aux patients**

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Quand SIMILASAN Grippe et fièvre No. 2 est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, SIMILASAN Grippe et fièvre No. 2 peut être utilisé en cas de grippe et refroidissements avec forte transpiration ou bouffée de chaleur (chaleur sèche), fièvre (périodiquement ou survenant brusquement), frissons; irritation et nervosité; maux de tête (battements, afflux de sang); gorge sèche et douloureuse (déglutition difficile, sensation de gorge nouée) et toux sèche et aboyante.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

## De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

En cas de fièvre élevée ou en cas d'aggravation de l'état général, consulter rapidement le médecin.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN Grippe et fièvre No. 2 peut être pris simultanément.

## Quand SIMILASAN Grippe et fièvre No. 2 ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Ne pas administrer chez les enfants de 2 ans. (En cas de forte fièvre et de maux de gorge chez un enfant de moins de 2 ans, il faut impérativement consulter un médecin).

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

## SIMILASAN Grippe et fièvre No. 2 peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

## Comment utiliser SIMILASAN Grippe et fièvre No. 2 ?

Si votre médecin n'a pas fait une autre prescription:

Enfants (à partir de 2 ans) et adultes: 7 globules par prise.

- **Troubles aigus:** Toutes les demi-heures. Réduire la fréquence au fur et à mesure de l'amélioration des troubles.
- **Pour parachever la guérison:** 3 fois par jour.

## Mode d'emploi:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Ne pas administrer chez les enfants de 2 ans.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre.

C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste

## Quels effets secondaires SIMILASAN Grippe et fièvre No. 2 peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN Grippe et fièvre No. 2 et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de SIMILASAN Grippe et fièvre No. 2 n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

## À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

### Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

### Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

## Que contient SIMILASAN Grippe et fièvre No. 2 ?

1 g de globules contient:

### Principes actifs

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D6 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 7.000 mg /

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D12 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 3.000 mg.

### Excipients

carbonate de calcium, xylite (E 967) 600 mg.

1 g correspond à 70-90 globules

## Numéro d'autorisation

50866 (Swissmedic)

## Où obtenez-vous SIMILASAN Grippe et fièvre No. 2 ?

### Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

## Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

# SIMILASAN

## Hémorroïdes

### Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### Quand SIMILASAN hémorroïdes est-il utilisé ?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN hémorroïdes peut être utilisé en cas de :

- Hémorroïdes externes (nodules) et internes
- Troubles hémorroïdaux accompagnés de démangeaisons, brûlures, douleurs lancinantes ou spasmodiques
- Petites hémorragies hémorroïdales (sang rouge)
- Anus enflammé et douloureux

### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN hémorroïdes peut être pris simultanément.

### Quand SIMILASAN hémorroïdes ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution ?

- Lorsque les symptômes apparaissent pour la première fois, l'automédication ne doit pas durer plus de 2 semaines. Il convient de consulter un médecin afin d'en clarifier la cause.
- Le traitement ne peut être répété qu'après diagnostic sûr de la part d'un médecin.
- Vous devez consulter un médecin en cas de perte de sang, de saignements répétés ou de traces de sang dans les selles accompagnées de douleurs à l'anus et de fièvre.
- Les enfants de moins de 12 ans qui présentent des hémorroïdes doivent faire l'objet d'un examen médical. De ce fait, la préparation ne devrait pas être administrée aux enfants de moins de 12 ans sans un avis médical préalable.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique,
  - vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication).

### SIMILASAN hémorroïdes peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné.

Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

### Comment utiliser SIMILASAN hémorroïdes ?

Sauf prescription contraire du médecin :  
Adolescents et adultes : 7 globules par prise.

- Troubles aigus : 6 fois par jour.
- Pour parachever la guérison : 3 fois par jour.

### Mode d'emploi :

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

### Quels effets secondaires SIMILASAN hémorroïdes peut-il provoquer ?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

### Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement :

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre une fois 7 globules. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous « Comment utiliser ... ».

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN hémorroïdes et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### A quoi faut-il encore faire attention ?

- Sans sucre. Avec xylite.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « Exp. » sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25° C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

### Que contient SIMILASAN hémorroïdes ?

Les globules contiennent : Acidum nitricum D10 / Capsicum annum D10 / Graphites D8 / Hamamelis virginiana D8 à parts égales.

La préparation contient en tant qu'excipients : xylite et carbonate de calcium.

## Numéro d'autorisation :

53359 (Swissmedic)

## Où obtenez-vous SIMILASAN hémorroïdes ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements : 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

## Titulaire de l'autorisation :

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en février 2009.

# SIMILASAN

## Inflammation de la gorge

### Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### Quand SIMILASAN inflammations de la gorge est-il utilisé ?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN inflammations de la gorge peut être utilisé en cas de :

- Inflammations douloureuses de la gorge, aiguës ou chroniques

### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

- En cas de fièvre élevée ou si dans le délai d'une semaine aucune amélioration n'est apparue, veuillez consulter un médecin.
- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN inflammations de la gorge peut être pris simultanément.

### Quand SIMILASAN inflammations de la gorge ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

- Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique,
  - vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication).

### Comment utiliser SIMILASAN inflammations de la gorge ?

Sauf prescription contraire du médecin :

Enfants à partir de 2 ans et adultes :

7 globules par prise.

- Troubles aigus : Plusieurs fois par jour (jusqu'à une fois par heure).
- Pour parachever la guérison : 3 fois par jour.

### Mode d'emploi :

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre.

C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

### Quels effets secondaires SIMILASAN inflammations de la gorge peut-il provoquer ?

Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour SIMILASAN inflammations de la gorge.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

### Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement :

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre une fois 7 globules. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous « Comment utiliser ... ».

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN inflammations de la gorge et informez-en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## A quoi faut-il encore faire attention ?

- Sans sucre. Avec xylite.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <Exp.> sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25° C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## Que contient SIMILASAN inflammations de la gorge ?

Les globules contiennent : Apis mellifica D10 / Belladonna (Atropa bella-donna) D8 / Lachesis D12 / Mercurius bijodatus (Hydrargyrum biiodatum) D12 à parts égales.

La préparation contient en tant qu'excipients : xylite et carbonate de calcium.

## Numéro d'autorisation :

50937 (Swissmedic)

## Où obtenez-vous SIMILASAN inflammations de la gorge ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements : 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage et de la pharmacie de poche)

## Titulaire de l'autorisation :

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en février 2009.

# SIMILASAN Rhume liquide

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Quand SIMILASAN Rhume liquide est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, SIMILASAN Rhume liquide peut être utilisé en cas de Rhume dû à un refroidissement, rhume allergique, rhume des foins et rhume nerveux avec écoulements abondants, irritants et aqueux; Rhume coulant avec sécrétion lacrymale et narines écorchées. L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

## De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN Rhume liquide peut être pris simultanément.

## Quand SIMILASAN Rhume liquide ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Ne pas utiliser chez les nouveaux-nés de moins de 28 jours. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

## SIMILASAN Rhume liquide peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

## Comment utiliser SIMILASAN Rhume liquide ?

Sauf prescription contraire du médecin:

Bébés (âgés de plus de 28 jours), enfants et adultes: 7 globules par prise.

- Troubles aigus: Tous les quarts ou toutes les demi-heures. Réduire la fréquence au fur et à mesure de l'amélioration des troubles.
- Pour parachever la guérison: 3 fois par jour.

## Mode d'emploi:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Ne convient pas aux nouveaux-nés de moins de 28 jours.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin.

Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

### **Quels effets secondaires SIMILASAN Rhume liquide peut-il provoquer ?**

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN Rhume liquide et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de SIMILASAN Rhume liquide n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

### **À quoi faut-il encore faire attention ?**

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

#### *Remarques concernant le stockage*

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

#### *Remarques complémentaires*

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

### **Que contient SIMILASAN Rhume liquide ?**

1 g de globules contient:

#### *Principes actifs*

Allium cepa (HAB) D4 8.500 mg / Allium cepa (HAB) D10 1.000 mg / Allium cepa (HAB) D15 0.500 mg.

#### *Excipients*

Xylite (E 967); carbonate de calcium

1 g correspond à 70–90 globules.

### **Numéro d'autorisation**

50672 (Swissmedic)

### **Où obtenez-vous SIMILASAN Rhume liquide ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage et de la pharmacie de poche)

### **Titulaire de l'autorisation**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

# SIMILASAN Toux grasse

### **Information destinée aux patients**

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### **Quand SIMILASAN toux grasse est-il utilisé ?**

Selon la conception homéopathique, SIMILASAN toux grasse peut être utilisé en cas de:

Toux sèche et saccadée avec engorgement; Toux bronchique aiguë et chronique avec glaires durcies et tenaces; Engorgement de la région des bronches avec difficulté d'expectorer les glaires tenaces (surtout le matin); Bronchite chronique des personnes âgées.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

### **De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?**

En cas de toux forte persistante plus de 7 jours, il faut consulter un médecin ou un pharmacien.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN toux grasse peut être pris/utilisé simultanément.

### **Quand SIMILASAN toux grasse ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?**

La toux de l'enfant de moins de 2 ans devrait faire l'objet d'une exploration médicale. Pour cette raison, la préparation ne devrait pas être administrée aux enfants de moins de 2 ans sans exploration médicale préalable.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

### **SIMILASAN toux grasse peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

## Comment utiliser SIMILASAN toux grasse?

Sauf prescription contraire du médecin:

Enfants (plus de 2 ans), adolescents et adultes:

7 globules par prise.

- **Troubles aigus:** Plusieurs fois par jour (voire toutes les heures)
- **Pour parachever la guérison:** 3–6 fois par jour.

## Mode d'emploi:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre.

C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 ans sans avis médical.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

## Quels effets secondaires SIMILASAN toux grasse peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN toux grasse et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de SIMILASAN toux grasse n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

## À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

*Remarques concernant le stockage*

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

*Remarques complémentaires*

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

## Que contient SIMILASAN toux grasse ?

1 g globules contiennent:

*Principes actifs*

Stibium sulfuratum aurantiacum (HAB) D12

3.333 mg / Kalium iodatum (HAB) D12 (HAB 5a) 3.333 mg/

Polygala senega (HAB) D8 3.333 mg

*Excipients*

Xylite (E 967) 600 mg; carbonate de calcium

1 g correspond à 70–90 globules.

## Numéro d'autorisation

51341 (Swissmedic)

## Où obtenez-vous SIMILASAN toux grasse? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage et de la pharmacie de poche)

## Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jönen

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

# SIMILASAN Toux irritative

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Quand SIMILASAN toux irritative est-il utilisé ?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN toux irritative peut être utilisé en cas de :

- Toux sèche avec douleur à l'arrière du sternum
- Toux irritative, toux avec chatouillements et envie de vomir
- Quintes de toux (surtout la nuit)

## De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

- En cas de toux forte persistante plus de 7 jours, il faut consulter un médecin ou un pharmacien.
- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si SIMILASAN toux irritative peut être pris simultanément.

## Quand SIMILASAN toux irritative ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

- La toux de l'enfant de moins de 2 ans devrait faire l'objet d'une exploration médicale. Pour cette raison, la préparation ne devrait pas être administrée aux enfants de moins de 2 ans sans exploration médicale préalable.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique,
  - vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication).

## Comment utiliser SIMILASAN toux irritative ?

Sauf prescription contraire du médecin :

Bébés, enfants et adultes : 7 globules par prise.

- Troubles aigus : Tous les quarts d'heure. Réduire la fréquence au fur et à mesure de l'amélioration des troubles.
- Pour parachever la guérison : 3–6 fois par jour.

## Mode d'emploi :

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

## Quels effets secondaires SIMILASAN toux irritative peut-il provoquer ?

Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour SIMILASAN toux irritative. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

## Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement :

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre une fois 7 globules. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous « Comment utiliser ... ».

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN toux irritative et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## A quoi faut-il encore faire attention ?

- Sans sucre. Avec xylite.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention < Exp. > sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25° C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## Que contient SIMILASAN toux irritative ?

Les globules contiennent : Drosera D3 60 %, D6 20 %, D12 20 %.

La préparation contient en tant qu'excipients : xylite et carbonate de calcium.

## Numéro d'autorisation :

51340 (Swissmedic)

## Où obtenez-vous SIMILASAN toux irritative ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements : 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage et de la pharmacie de poche)

## Titulaire de l'autorisation :

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en février 2009.

# SIMILASAN Troubles de dentition

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Quand SIMILASAN Troubles de dentition est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, SIMILASAN Troubles de dentition peut être utilisé en cas de Éruption difficile ou trop tardive des dents; Troubles de dentition accompagnés de: Salivation intense et d'un besoin aigu de mordre, Diarrhée; Irritation, nervosité, dentition douloureuse.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

### **De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?**

Si votre médecin a prescrit d'autres médicaments à votre enfant, demandez-lui ou à votre pharmacien / pharmacienne si SIMILASAN Troubles de dentition peut être utilisé simultanément.

### **Quand SIMILASAN Troubles de dentition ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?**

En raison de la forme galénique des globules, ce médicament ne doit être utilisé qu'après consultation médicale pour les enfants âgés de moins d'un an.

En raison de l'indication homologuée, SIMILASAN Troubles de dentition est prévu pour les enfants en bas âge et les enfants jusqu'à 6 ans.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si votre enfant

- souffre d'une autre maladie
- prend êtes allergique
- prend déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

### **SIMILASAN Troubles de dentition peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?**

Non applicable.

### **Comment utiliser SIMILASAN Troubles de dentition ?**

Sauf prescription contraire du médecin:

- **Enfants en bas âge et enfants jusqu'à 6 ans au début de la dentition:** 3 x par jour 7 globules (granules).
- **Enfants en bas âge et enfants jusqu'à 6 ans en cas de troubles aigus de la dentition:** 7 globules (granules) tous les quarts d'heure, jusqu'à disparition complète des troubles; jusqu'à 70 globules par jour au maximum.

En raison de l'indication homologuée, SIMILASAN Troubles de dentition est prévu pour les enfants en bas âge et les enfants jusqu'à 6 ans.

### **Mode d'emploi:**

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou les troubles reviennent.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

### **Quels effets secondaires SIMILASAN Troubles de dentition peut-il provoquer ?**

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN Troubles de dentition et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de SIMILASAN Troubles de dentition n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

### **À quoi faut-il encore faire attention ?**

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

#### *Remarques concernant le stockage*

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Conserver hors de portée des enfants.

#### *Remarques complémentaires*

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

### **Que contient SIMILASAN Troubles de dentition peut-il provoquer ?**

1 g de globules contient:

#### *Principes actifs*

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D12

1.666 mg / Calcium fluoratum (HAB) D12 1.666 mg /

Calcium phosphoricum (HAB) D12 1.666 mg / Chamomilla

recutita (HAB) D8 1.666 mg / Ferrum phosphoricum (HAB) D12

1.66 mg / Podophyllum peltatum (HAB) D12 1.66 mg

#### *Excipients*

xylite (E 967) 600 mg, carbonate de calcium

1 g correspond à 70–90 globules

### **Numéro d'autorisation**

47659 (Swissmedic)

### **Où obtenez-vous SIMILASAN Troubles de dentition peut-il provoquer ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

### **Titulaire de l'autorisation**

Similasan AG, CH-8916 Jonen

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

# SIMILASAN

## Troubles du sommeil

### Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### Quand SIMILASAN troubles du sommeil est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, SIMILASAN troubles du sommeil peut être utilisé en cas de: Insomnies ou sommeil entrecoupé; Suractivité mentale au moment de s'endormir, tension et agitation, sommeil troublé; Sommeil agité, léger, riche en rêves.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Les troubles du sommeil pouvant avoir les origines les plus diverses, le moment où l'effet de ce médicament commence à se faire ressentir diffère d'un individu à l'autre. La plupart du temps, les insomnies tenaces et chroniques nécessitent une durée de traitement plus longue.

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN troubles du sommeil peut être pris simultanément.

### Quand SIMILASAN troubles du sommeil ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication !).

### SIMILASAN troubles du sommeil peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

### Comment utiliser SIMILASAN troubles du sommeil ?

Sauf prescription contraire du médecin: Enfants (plus de 2 ans), adolescents et adultes:

7 globules par prise.

- Troubles du sommeil occasionnels: Le soir avant le coucher. Si l'effet ne se fait pas sentir immédiatement, renouveler la prise au bout d'un quart d'heure. En cas de réveils fréquents, la nuit aussi.
- Troubles du sommeil chroniques: Matin, midi et soir avant le coucher. En cas de réveils fréquents, la nuit aussi.

### Mode d'emploi:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
  - Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou les troubles reviennent.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

### Quels effets secondaires SIMILASAN troubles du sommeil peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN troubles du sommeil et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste. Aucun effet secondaire de SIMILASAN troubles du sommeil n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

### À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

#### Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C). Conserver hors de portée des enfants.

#### Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

## Que contient SIMILASAN troubles du sommeil?

1 g de globules contient:

### Principes actifs

Avena sativa (HAB) D12 2.500 mg / Hepar sulfuris (HAB) D12 2.500 mg / Pulsatilla pratensis (HAB) D15 2.500 mg / Zincum isovalerianicum (HAB) D12 2.500 mg

### Excipients

Carbonate de calcium

Xylitol (E 967) 600 mg

1 g correspond à 70-90 globules

## Numéro d'autorisation

51360 (Swissmedic)

## Où obtenez-vous SIMILASAN troubles du sommeil?

### Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage et de la pharmacie de poche)

## Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jönen

**Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).**

# SIMILASAN

## Troubles veineux

### Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### Quand SIMILASAN troubles veineux est-il utilisé ?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN troubles veineux peut être utilisé en cas de :

- Veines douloureuses avec tendance inflammatoire, varices
- Fatigue, jambes lourdes ou raides
- Crampes dans les mollets et les jambes
- Jambes brûlantes ou glacées
- Stases veineuses avec enflures (œdème)

## De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN troubles veineux peut être pris simultanément.
- Si l'état empire ou si l'amélioration tarde, consultez le médecin.
- Outre le traitement médicamenteux, il faut veiller à avoir suffisamment d'activité physique (natation, promenades) et éviter la station debout prolongée. La nuit, surélever les jambes.

## Quand SIMILASAN troubles veineux ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution ?

- Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique
  - vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication)

## Comment utiliser SIMILASAN troubles veineux ?

Si votre médecin n'a pas fait une autre prescription :

Adultes : 7 globules par prise.

- Troubles aigus : 6 fois par jour.
- Pour parachever la guérison : 3 fois par jour.

## Mode d'emploi :

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Adressez vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

## Quels effets secondaires SIMILASAN troubles veineux peut-il provoquer ?

Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour SIMILASAN troubles veineux.

Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

## Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement :

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre en une fois 7 globules. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous « Comment utiliser ... »

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN troubles veineux et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## A quoi faut-il encore faire attention ?

- Sans sucre. Avec xylite.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date indiquée sur le récipient par la mention <Exp.>.
- Conserver à température ambiante entre 15 – 25° C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## Que contient SIMILASAN troubles veineux ?

Les globules contiennent : *Aesculus hippocastanum* D8 / *Aristolochia clematitis* D10 / *Lycopodium clavatum* D12 / *Vipera berus* D12 en parties égales.

Excipients : xylite et carbonate de calcium.

## Numéro d'autorisation :

53360 (Swissmedic)

## Où obtenez-vous SIMILASAN troubles veineux ?

### Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements : 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

## Titulaire de l'autorisation :

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic) en février 2009.

# SIMILASAN

## Voies digestives

### Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, pharmacien ou droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### Quand SIMILASAN voies digestives est-il utilisé ?

Conformément au schéma thérapeutique homéopathique SIMILASAN voies digestives peut être utilisé en cas de :

- Inflammations des voies digestives, avec : Nausées, vomissements, diarrhées ; Douleurs convulsives (coliques) ; Manque d'appétit ou dégoût de la nourriture ; Etat d'épuisement ou nervosité ; Renvois aigres, abdomen ballonné et douloureux au toucher
- Gastro-entérites aiguës, avec : Diarrhées fortement nauséabondes, mousseuses ou liquides, irritantes ; Crampes et faux besoin d'aller à la selle ; Vomissements
- Troubles digestifs après absorption de : Boissons ou mets froids (glaces) ; Mets acidulés, fruits à pépins ou à teneur élevée en eau ; Aliments mal supportés

### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

- Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou pharmacien si SIMILASAN voies digestives peut être pris simultanément.

### Quand SIMILASAN voies digestives ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

- Les troubles de la digestion des enfants de moins de 12 ans doivent faire l'objet d'une exploration médicale. Pour cette raison, cette préparation ne doit pas être administrée aux enfants de moins de 12 ans sans exploration médicale préalable.
- Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
  - vous souffrez d'une autre maladie,
  - vous êtes allergique,
  - vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication) !

## Comment utiliser SIMILASAN voies digestives ?

Sauf prescription contraire du médecin :

Enfants et adultes : 7 globules par prise.

- Troubles aigus : Tous les quarts ou toutes les demi-heures. Réduire la fréquence au fur et à mesure de l'amélioration des troubles.
- Troubles légers et pour parachever la guérison : 3 – 6 fois par jour.

## Mode d'emploi :

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre.

C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou lorsque les troubles reviennent.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

## Quels effets secondaires SIMILASAN voies digestives peut-il provoquer ?

Lors d'un emploi approprié, aucun effet secondaire indésirable n'a été constaté jusqu'à ce jour pour SIMILASAN voies digestives. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Lors de la prise de médicaments homéopathiques, les troubles peuvent s'aggraver passagèrement (aggravation initiale).

## Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement :

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Prendre une fois 7 globules. Attendre la réaction.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous « Comment utiliser ... ».

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN voies digestives et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## A quoi faut-il encore faire attention ?

- Sans sucre. Avec xylite.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention < Exp. > sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## Que contient SIMILASAN voies digestives ?

Les globules contiennent : Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D6 / Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) D6 / Mercurius sublimatus corrosivus (Hydrargyrum bichloratum) D6 / Podophyllum peltatum D6 à parts égales. La préparation contient en tant qu'excipients : xylite et carbonate de calcium.

## Numéro d'autorisation :

50868 (Swissmedic)

## Où obtenez-vous SIMILASAN voies digestives ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements : 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de voyage et de la pharmacie de poche)

## Titulaire de l'autorisation :

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en février 2009.