

Similasan

Farmacia tascabile

Medicamenti omeopatici

Indice

	Pagina		Pagina
• Arnica plus	2	• Febbre e influenza nr. 2	
• Coliche nervose	3	(Sudorazione intensa e	
• Disturbi del sonno	4	irrequietezza)	12
• Disturbi delle vene	5	• Infiammazioni della gola	14
• Disturbi dovuti alla		• Lattopoiesi	15
dentizione	6	• Raffreddore con	
• Disturbi gastrointestinali	8	gocciolamento	16
• Emorroidi	9	• Stitichezza	17
• Eruzioni cutanee	10	• Tosse catarrale	18
• Febbre e influenza nr. 1		• Tosse irritativa	19
(Sensazione di freddo e di calore			
in successione, dolori agli arti)	11		

SIMILASAN Arnica plus

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa SIMILASAN Arnica plus?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici SIMILASAN Arnica plus può essere usato in caso di slogature, lussazioni, contusioni, ematomi, ferite dei tessuti molli (dovute a tagli o punture), dolori muscolari, ustioni, scottature solari, disturbi post-operatori (dolore della ferita), disturbi dovuti a fratture ossee. L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Le ferite estese, molto contaminate e profonde, come anche i morsi e le ferite da punta richiedono un trattamento medico (pericolo di tetano). Rivolgersi, inoltre, al medico se le dimensioni della ferita tendono a non ridursi o se la ferita non si rimargina nel giro di 7 giorni. Lo stesso vale se il margine della ferita sono molto arrossati, o la ferita comincia improvvisamente a gonfiarsi e a far molto male o se compare febbre (pericolo di setticemia).

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SIMILASAN Arnica plus.

Quando non si può assumere SIMILASAN Arnica plus e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Non indicato per bambini piccoli sotto i 2 anni.

Non usare in caso di ipersensibilità nota a: Arnica montana (arnica), Calendula officinalis (calendula) o altre composite (Asteraceae) (ad es. Achillea millefolium (achillea), artemisia ecc.)

Se lo stato generale dovesse peggiorare (p.es. febbre), bisogna consultare immediatamente un medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere SIMILASAN Arnica plus durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN Arnica plus?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini (sopra i 2 anni), adolescenti e adulti:
7 globuli per ogni somministrazione.

- **Disturbi acuti:** 6 volte al giorno. In caso di dolori forti anche più spesso (fino a ogni mezz'ora).
- **Per la guarigione:** 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Far sciogliere in bocca i globuli.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

Non indicato per bambini piccoli sotto i 2 anni.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Arnica plus?

Con l'assunzione di medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Arnica plus e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di SIMILASAN Arnica plus. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN Arnica plus?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Arnica montana (HAB) D4 2.500 mg / Calendula officinalis (HAB) D4 2.500 mg / Hypericum perforatum (HAB) D4 2.500 mg / Symphytum officinale (HAB) D6 2.500 mg

Sostanze ausiliarie

Calci carbonas; Xylitolum (E 967)

1 g di globuli equivale a 70–90 globuli

Numero dell'omologazione

51362 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Arnica plus?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio e della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN Coliche nervose

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno. E'ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN coliche nervose?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN coliche nervose trova impiego nei casi di:

- Crampi allo stomaco e all'intestino a causa di nervosismo o aggravio psichico
- Disturbi digestivi di natura nervosa con flatulenza e dolori spastici e colici
- Crampi alle vie biliari e alla cistifellea

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- Consultare il proprio medico in caso di peggioramento persistente, febbre alta o se nel giro di una settimana non si osserva alcun miglioramento.
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile usare contemporaneamente anche SIMILASAN coliche nervose.

Quando non si può assumere SIMILASAN coliche nervose e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- In presenza di disturbi digestivi nei bambini al di sotto dei 12 anni, è necessario che un medico ne accerti la causa. Perciò, questo preparato non deve essere impiegato nei bambini al di sotto dei 12 anni senza aver consultato un medico.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende o applica esternamente (nel caso dei preparati esterni) altri medicinali.

Come usare SIMILASAN coliche nervose?

Salvo diversa prescrizione medica:

Neonati, bambini e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- Disturbi acuti: Ogni quarto d'ora – mezz'ora. Diminuire la frequenza non appena sopraggiunge un miglioramento.
- Per la completa guarigione: 3 volte al giorno fino a sparizione dei sintomi.

Avvertenze per l'assunzione:

- Far sciogliere in bocca i globuli.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN coliche nervose?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN coliche nervose.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

SIMILASAN

Disturbi del sonno

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo «Come usare ...».

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN coliche nervose e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN coliche nervose?

Globuli contengono: Anamirta cocculus D15 / Belladonna (Atropa bella-donna) D12 / Chamomilla recutita D12 / Colocynthis D12 / Magnesium phosphoricum D12 in parti uguali. Il preparato contiene come eccipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

Numero dell'omologazione:

52311 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN coliche nervose?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'autorizzazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa SIMILASAN disturbi del sonno?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici SIMILASAN disturbi del sonno può essere usato in caso di Difficoltà ad addormentarsi e frequenti risvegli; Disturbi del sonno causati da agitazione e tensione nervosa; Sonno leggero e agitato con frequenti sogni. L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Dato che i disturbi del sonno possono avere varie cause, il tempo necessario perché si manifesti l'effetto dopo l'assunzione del preparato varia da persona a persona. Un'insonnia cronica e ostinata generalmente richiede un trattamento prolungato.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SIMILASAN disturbi del sonno.

Quando non si può assumere SIMILASAN disturbi del sonno e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Non adatto per bambini di età inferiore ai 2 anni.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere SIMILASAN disturbi del sonno durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN disturbi del sonno?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini (dai 2 anni), adolescenti e adulti:

7 globuli per ogni somministrazione.

- Disturbi occasionali: La sera prima di andare a dormire. In caso di insuccesso, ripetere ogni quarto d'ora. In caso di risvegli frequenti, anche di notte.
- Disturbi cronici: La mattina, a mezzogiorno e la sera prima di andare a dormire. In caso di risvegli frequenti, anche di notte.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

Non adatto per bambini di età inferiore ai 2 anni.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN disturbi del sonno?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN disturbi del sonno e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di SIMILASAN disturbi del sonno. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN disturbi del sonno?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Avena sativa (HAB) D12 2.500 mg / Hepar sulfuris (HAB) D12

2.500 mg / Pulsatilla pratensis (HAB) D15 2.500 mg /

Zincum isovalerianicum (HAB) D12 2.500 mg

Sostanze ausiliarie

Carbonato di calcio

Xilitolo (E 967) 600 mg

1 g corrisponde a 70–90 globuli

Numero dell'omologazione

51360 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN disturbi del sonno?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio e della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN Disturbi delle vene

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN disturbi delle vene?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN disturbi delle vene trova impiego nei casi di:

- Vene e vene varicose doloranti e infiammate
- Gambe stanche, pesanti e tese
- Crampi nei polpacci e nelle gambe in genere
- Senso di calore o di freddo nelle gambe
- Stasi venose con tumefazioni (edemi)

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN disturbi delle vene.
- In caso di continuo peggioramento o di mancato miglioramento, consultare un medico.
- In aggiunta alla terapia farmacologica, si dovrebbe fare movimento a sufficienza (nuoto, passeggiate) ed evitare di stare in piedi a lungo. Durante la notte, tenere le gambe leggermente sollevate.

Quando non si può assumere SIMILASAN disturbi delle vene e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Fino ad oggi non si conoscono controindicazioni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Come usare SIMILASAN disturbi delle vene?

Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- Disturbi acuti: 6 volte al giorno.
- Per la completa guarigione: 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN disturbi delle vene?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN disturbi delle vene. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo «Come usare ...».

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN disturbi delle vene e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN disturbi delle vene?

Globuli contengono: *Aesculus hippocastanum* D8 / *Aristolochia clematitis* D10 / *Lycopodium clavatum* D12 / *Vipera berus* D12 in parti uguali.

Eccipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

Numero dell'omologazione:

53360 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN disturbi delle vene?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione può essere usato in caso di Dentizione difficile e ritardata; Disturbi della dentizione accompagnati da: Forte secrezione salivare e bisogno di mordere, Diarrea; Irritazione, agitazione, dolori dovuti alle dentizioni. L'uso di questo medicamento nel settore di informazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento ?

Se il medico ha prescritto a suo/a figlio/a altri medicinali, consulti il medico o il farmacista per sapere se SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione possa essere assunto in concomitanza.

Quando non si può assumere SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza ?

Essendo disponibile nella forma farmaceutica in globuli, nei bambini piccoli sotto 1 anno di vita il medicamento deve essere utilizzato solo previo consulto medico.

L'indicazione omologata di SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione ne prevede l'uso in bambini piccoli e in bambini fino a 6 anni.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui suo/a figlio/a

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione durante la gravidanza o l'allattamento ?

Non pertinente.

Come usare SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione ?

Salvo diversamente prescritto dal medico:

- **Bambini piccoli e bambini fino a 6 anni con principio di dentizione:** 7 globuli (granuli) 3 volte al giorno.
- **Bambini piccoli e bambini fino a 6 anni in caso di disturbi acuti della dentizione:** 7 globuli (granuli) ogni quarto d'ora fino alla completa scomparsa dei disturbi, per un massimo di 70 globuli al giorno.

L'indicazione omologata di SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione ne prevede l'uso in bambini piccoli e in bambini fino a 6 anni.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione ?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale).

Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso coretto di SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto ?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione ?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D12

1.666 mg / Calcium fluoratum (HAB) D12 1.666 mg /

Calcium phosphoricum (HAB) D12 1.666 mg / Chamomilla

recutita (HAB) D8 1.666 mg / Ferrum phosphoricum (HAB) D12

1.66 mg / Podophyllum peltatum (HAB) D12 1.66 mg

Sostanze ausiliarie

xilitolo (E 967) 600 mg; carbonato di calcio

1 g equivale a 70–90 globuli

Numero dell'omologazione

47659 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione ? Quali confezioni sono disponibili ?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN

Disturbi gastrointestinali

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN disturbi gastrointestinali?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN disturbi gastrointestinali trova impiego nei casi di:

- Infiammazioni gastrointestinali accompagnate da: Nausea, vomito, diarrea; Crampi (coliche) e bruciori; Mancanza di appetito e avversione nei confronti di alcuni cibi; Stato di esaurimento e agitazione; Eruttazione, ventre dilatato e sensibile al tatto
- Catarro acuto gastrointestinale accompagnato da: Diarrea che provoca lesioni, molto maleodorante, viscida o acquosa; Crampi e tenesmo anale (bisogno continuo di defecare); Vomito
- Disturbi gastrointestinale causati da: Bevande e cibo ghiacciato (gelato); Cibo acido, frutta che contiene molto acqua; Cibo indigesto

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile usare contemporaneamente anche SIMILASAN disturbi gastrointestinali.

Quando non si può assumere SIMILASAN disturbi gastrointestinali e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- In presenza di disturbi digestivi nei bambini al di sotto dei 12 anni, è necessario che un medico ne accerti la causa. Perciò, questo preparato non deve essere impiegato nei bambini al di sotto dei 12 anni senza aver consultato un medico.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende o applica esternamente (nel caso dei preparati esterni) altri medicinali!

Come usare SIMILASAN disturbi gastrointestinali?

Salvo diversa prescrizione medica:

Bambini e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- Disturbi acuti: Ogni quarto d'ora – mezz'ora. Diminuire la frequenza non appena sopraggiunge un miglioramento.
- Disturbi leggeri e per la completa guarigione: 3 – 6 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Far sciogliere in bocca i globuli.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto.

In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN disturbi gastrointestinali?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN disturbi gastrointestinali.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo «Come usare ...».

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN disturbi gastrointestinali e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN disturbi gastrointestinali?

Globuli contengono: Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D6 / Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) D6 / Mercurius sublimatus corrosivus (Hydrargyrum bichloratum) D6 / Podophyllum peltatum D6 in parti uguali. Il preparato contiene come eccipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

Numero dell'omologazione:

50868 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN disturbi gastrointestinali? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio e della farmacia tascabile)

Titolare dell'autorizzazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN Emorroidi

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN emorroidi?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN emorroidi trova impiego nei casi di:

- Emorroidi esterne (noduli) ed interne
- Disturbi emorroidali accompagnati da prurito, bruciore, dolori lancinanti e contrazioni convulsive
- Leggere emorragie (sangue chiaro)
- Infiammazione dell'ano

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN emorroidi.

Quando non si può assumere SIMILASAN emorroidi e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Alla prima manifestazione del disturbo, il trattamento autonomo non può durare per più di 2 settimane. Per eventuali chiarimenti, consultare il medico.
- I trattamenti ripetuti devono essere effettuati esclusivamente previa diagnosi esatta da parte di un medico.
- In caso di perdita di sangue, ripetuti sanguinamenti o sospetta presenza di sangue nelle feci, nonché qualora si manifestino in concomitanza dolori all'ano e febbre, consultare un medico per opportuni accertamenti.
- Nei bambini al di sotto dei 12 anni le emorroidi richiedono l'intervento del medico. In questi casi il preparato va quindi somministrato esclusivamente su prescrizione medica.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può somministrare SIMILASAN emorroidi durante la gravidanza e l'allattamento?

Con un uso conforme del preparato, in base alle esperienze fatte finora non si conoscono rischi per il bambino. Peraltro non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Durante la gravidanza e l'allattamento si consiglia di evitare, per precauzione, il più possibile l'uso di medicinali e comunque di rivolgersi per un consiglio al proprio medico curante, al farmacista o al droghiere.

Come usare SIMILASAN emorroidi?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

- Giovani e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.
- Disturbi acuti: 6 volte al giorno.
- Per la guarigione: 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Far sciogliere in bocca i globuli.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN emorroidi?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN emorroidi. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere. L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta solo 7 globuli e aspettare la reazione.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo «Come usare ...».

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN emorroidi e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN emorroidi?

Globuli contengono: Acidum nitricum D10 / Capsicum annum D10 / Graphites D8 / Hamamelis virginiana D8 in parti uguali. Il preparato contiene come eccipienti: xilitolo e carbonato di calcio

Numero dell'omologazione:

53359 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN emorroidi?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN

Eruzioni cutanee

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN eruzioni cutanee?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN eruzioni cutanee trova impiego in caso di eruzioni cutanee ed eczemi come:

- Eruzioni cutanee ed eczemi secchi, squamosi ed umidi
- Macchie infiammate ed eruzioni arrossate
- Orticaria, gonfiore
- Erpete

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN eruzioni cutanee.

Quando non si può assumere SIMILASAN eruzioni cutanee e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Nei bambini di età inferiore a due anni il medicamento va somministrato solo dietro prescrizione del medico.
- In presenza di lesioni cutanee di grossa estensione, infezioni e qualora si sospettino malattie sistemiche dovrebbe essere consultato un medico.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Come usare SIMILASAN eruzioni cutanee?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Neonati, bambini e adulti:

7 globuli 3 volte al giorno.

Modalità di assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto.
In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.
Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.
Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.
Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN eruzioni cutanee?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN eruzioni cutanee.
Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.
L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo «Come usare ...».

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN eruzioni cutanee e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN eruzioni cutanee?

Globuli contengono: Mercurius solubilis Hahnemanni D12 / Natrium muriaticum (Natrium chloratum) D12 / Rhus toxicodendron D10 / Selenium D15 in parti uguali.
Il preparato contiene come eccipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

Numero dell'omologazione:

50884 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN eruzioni cutanee?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'autorizzazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN

Febbre e influenza nr. 1

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN febbre e influenza nr.1?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN febbre e influenza nr.1 trova impiego in caso di:

- Malattie da raffreddamento allo stadio iniziale o acuto, con febbre e tosse
- Influenza e raffreddore con dolori articolari e forte stanchezza
- Influenza e raffreddore con brividi alternati a sudorazioni
- Influenza e raffreddore con sensazioni di calore e pressione nella testa, viso arrossato (fronte e guance calde)

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- In caso di febbre alta o di peggioramento dello stato di salute è opportuno consultare tempestivamente il medico.
- Si consiglia di assumere il preparato non appena compaiono i primi sintomi del raffreddore (dolori alle articolazioni, brividi e vampate di calore, stanchezza).
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN febbre e influenza nr.1.
- In caso di continuo peggioramento o mancata guarigione consultare un medico.

Quando non si può usare SIMILASAN febbre e influenza nr.1 e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Fino ad oggi non si conoscono controindicazioni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Come usare SIMILASAN febbre e influenza nr.1?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Neonati, bambini e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- Primi sintomi dell'influenza o del raffreddore:
3 – 6 volte al giorno.
- Disturbi acuti: Ogni mezz'ora. Diminuire la frequenza non appena sopraggiunge un miglioramento.
- Per la guarigione: 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Far sciogliere in bocca i globuli.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico. Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN febbre e influenza nr.1?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN febbre e influenza nr.1.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo «Come usare ...».

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN febbre e influenza nr.1 e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tener fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN febbre e influenza nr.1?

Globuli contengono: Ferrum phosphoricum D6 60 % / D8 20 % / D12 20 %. Il preparato contiene come eccipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

Numero dell'omologazione:

53322 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN febbre e influenza nr.1?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione:

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2?

Secondo la confezione che sta alla base dei medicinali omeopatici SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2 può essere usato in caso di influenza e malattie da raffreddamento con forte sudorazione o vampate di calore (calore secco), febbre (ricorrente o improvvisa), brividi; irritabilità generale e irrequietezza; cefalea (pulsante, con afflusso di sangue); gola secca e dolente (stimolo a deglutire, sensazione di soffocamento) e tosse secca, abbaianate.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di febbre alta o di peggioramento dello stato di salute è opportuno consultare tempestivamente il medico.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2.

Quando non si può assumere SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2 e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Non adatto a bambini di età inferiore a 2 anni.

(Nel caso di bambini di età inferiore a 2 anni le cause della febbre alta e del mal di gola devono essere accertate da un medico).

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2 durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini (dai 2 anni) e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- **Disturbi acuti:** Ogni mezz'ora. Diminuire la frequenza non appena sopraggiunge un miglioramento.
- **Per la completa guarigione:** 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

Non adatto a bambini di età inferiore a 2 anni.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2 e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso coretto di SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D6 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 7.000 mg /

Belladonna (Ph.Eur.Hom.) D12 (Ph.Eur.Hom. 1.1.3) 3.000 mg.

Sostanze ausiliarie

carbonato di calcio, xilitolo (E 967) 600 mg.

1 g equivale a 70–90 globuli

Numero dell'omologazione

50866 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Febbre e influenza nr. 2?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN

Infiammazioni della gola

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN infiammazioni della gola?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN infiammazioni della gola trova impiego nei casi di:

- Infiammazioni acute e croniche della gola con sintomatologia dolorosa

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- In caso di febbre alta o se non si manifesta un miglioramento entro una settimana, bisogna consultare un medico.
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN infiammazioni della gola.

Quando non si può assumere SIMILASAN infiammazioni della gola e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Fino ad oggi non si conoscono controindicazioni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Come usare SIMILASAN infiammazioni della gola?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia: Bambini oltre due anni e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

Disturbi acuti: Più volte al giorno (fino a ogni ora).

Per la completa guarigione: 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN infiammazioni della gola?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN infiammazioni della gola. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere. L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo «Come usare...».

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN infiammazioni della gola e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN infiammazioni della gola?

Globuli contengono: Apis mellifica D10 / Belladonna (Atropa bella-donna) D8 / Lachesis D12 / Mercurius bijodatus (Hydrargyrum biiodatum) D12 in parti uguali.

Il preparato contiene come eccipienti: xilitolo e carbonato di calcio.

Numero dell'omologazione:

50937 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN infiammazioni della gola? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio e della farmacia tascabile)

Titolare dell'autorizzazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN Lattoipoesi

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN lattoipoesi ?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN lattoipoesi trova impiego nei casi di:

- Scarsa produzione di latte e per favorire il flusso latteo

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN lattoipoesi.

Quando non si può assumere SIMILASAN lattoipoesi e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Fino ad oggi non si conoscono controindicazioni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Come usare SIMILASAN lattoipoesi ?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Forte carenza di latte, flusso latteo molto scarso:

7 globuli 6 volte al giorno

Ottimizzazione e mantenimento della quantità di latte:

7 globuli 2-3 volte al giorno

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Durata del trattamento: Se necessario, per tutto il periodo dell'allattamento.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN lattoipoesi ?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN lattoipoesi.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere. L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come si usa ...".

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN lattoipoesi e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN lattoipoesi ?

Globuli contengono: Alfalfa D6 / Lac caninum D10 / Urtica urens D6 in parti uguali. Il preparato contiene come eccipienti xilitolo e carbonato di calcio.

Numero dell'omologazione:

54925 (Swissmedic)

Dov'è ottenibile SIMILASAN lattopoesi ?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'autorizzazione:

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento ?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento può essere usato in caso di Raffreddore comune, rinite allergica, raffreddore da fieno e raffreddore nervoso con secrezione copiosa, liquida e infiammante; Raffreddore con abbondante secrezione e lacrimazione, narici infiammate.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento ?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento.

Quando non si può assumere SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza ?

Non usare nei neonati sotto i 28 giorni di vita.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento durante la gravidanza o l'allattamento ?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento ?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Neonati (sopra i 28 giorni), bambini e adulti:

7 globuli per ogni somministrazione.

- Sintomi acuti: Ogni quarto d'ora - mezz'ora. Diminuire la frequenza non appena sopraggiunge un miglioramento.
- Per la completa guarigione: 3 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

Non indicato per neonati sotto i 28 giorni di vita.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento ?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale).

Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso coretto di SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Allium cepa (HAB) D4 8.500 mg / Allium cepa (HAB) D10

1.000 mg / Allium cepa (HAB) D15 0.500 mg.

Sostanze ausiliarie

Xilitolo (E 967); carbonato di calcio

1 g equivale a 70–90 globuli

Numero dell'omologazione

50672 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Raffreddore con gocciolamento? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio e della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN Stitichezza

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa SIMILASAN Stitichezza?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici SIMILASAN Stitichezza può essere usato in caso di stitichezza (spastica, cronica), pigrizia intestinale, feci dure. L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di stitichezza ostinata o cronica si può registrare un miglioramento solo dopo 4–6 settimane di trattamento. In caso di stitichezza è fondamentale assumere molti liquidi ed alimenti ricchi di fibre (verdura, frutta, pane integrale), e praticare attività fisica (sport).

Se la stitichezza continua a peggiorare o non subentra alcun miglioramento, occorre consultare il medico.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SIMILASAN Stitichezza.

Quando non si può assumere SIMILASAN Stitichezza e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

In caso di stitichezza o pigrizia intestinale in bambini sotto i 12 anni è necessario un accertamento medico. Pertanto in bambini sotto i

12 anni il preparato va usato solo su indicazione del medico. Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere SIMILASAN Stitichezza durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN Stitichezza?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Adolescenti a partire dai 12 anni e adulti: 7 globuli (granuli) per ogni somministrazione.

- **Disturbi acuti:** 3 volte al giorno.
- **Per la completa guarigione:** 1 volta al giorno (mattina o sera).

Nei bambini sotto i 12 anni, somministrare SIMILASAN Stitichezza secondo le indicazioni del medico o dopo aver consultato medico.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Stitichezza ?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale).

Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Stitichezza e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso coretto di SIMILASAN Stitichezza.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere

Di che altro occorre tener conto ?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN Stitichezza ?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Graphites (HAB) D12 2.500 mg / Magnesium chloratum (HAB)

D8 2.500 mg / Sulfur (HAB) D15 2.500 mg / Thuja occidentalis

(HAB) D10 2.500mg.

Sostanze ausiliarie

Xilitolo (E 967) 600 mg e carbonato di calcio.

1 g equivale a 70–90 globuli.

Numero dell'omologazione

51373 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Stitichezza ? Quali confezioni sono disponibili ?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN Tosse catarrale

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa SIMILASAN tosse catarrale?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici SIMILASAN tosse catarrale può essere usato in caso di Tosse stizzosa o tosse con catarro; Bronchite acuta o cronica con catarro vischioso e tenace; Mucosità nei bronchi con espettorazione difficile del muco (soprattutto la mattina); Catarro bronchiale cronico, soprattutto nelle persone anziane. L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Rivolgersi al medico o al farmacista se la tosse forte persiste per più di sette giorni.

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere SIMILASAN tosse catarrale.

Quando non si può assumere SIMILASAN tosse catarrale e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Nei bambini di età inferiore ai 2 anni, la tosse richiede l'intervento di un medico. Perciò, si consiglia l'impiego di questo preparato nei bambini al di sotto dei 2 anni senza aver consultato un medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere SIMILASAN tosse catarrale durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche.

Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare SIMILASAN tosse catarrale?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Bambini (dai 2 anni), adolescenti e adulti:

7 globuli per ogni somministrazione.

- **Disturbi acuti:** Più volte al giorno (fino ad ogni ora).
- **Per la completa guarigione:** 3-6 volte al giorno

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Nei bambini piccoli sotto i 2 anni, somministrare solo su indicazione medica.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN tosse catarrale?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN tosse catarrale e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di SIMILASAN tosse catarrale. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN tosse catarrale?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Stibium sulfuratum aurantiacum (HAB) D1Z

3.333 mg / Kalium iodatum (HAB) D1Z (HAB 5a) 3.333 mg/

Polygala senega (HAB) D8 3.333 mg

Sostanze ausiliarie

Xilitolo (E 967) 600 mg; carbonato di calcio

1 g corrisponde a 70-90 globuli

Numero dell'omologazione

51341 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN tosse catarrale?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio e della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

SIMILASAN Tosse irritativa

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente questo prospetto, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente dal suo medico oppure è stato da lei acquistato in farmacia o drogheria senza ricetta medica. Per ottenere il massimo giovamento da questo preparato, lo utilizzi come descritto nel prospetto interno ovvero attenendosi alle istruzioni che ha ricevuto dal medico, farmacista o dal droghiere. Abbia cura di conservare il prospetto del medicamento, perché eventualmente lo vorrà leggere ancora in un secondo tempo.

Quando si usa SIMILASAN tosse irritativa?

Secondo i principi farmacologici dell'omeopatia, SIMILASAN tosse irritativa trova impiego nei casi di:

- Tosse stizzosa con dolori dietro lo sterno
- Tosse irritativa con conati di vomito
- Accessi di tosse (soprattutto di notte)

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- Rivolgersi al medico o al farmacista se la tosse forte persiste per più di sette giorni.
- Qualora siano stati prescritti altri medicinali da parte del medico curante, consultare il medico o il farmacista per sapere se è possibile assumere contemporaneamente anche SIMILASAN tosse irritativa.

Quando non si può assumere SIMILASAN tosse irritativa e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- In presenza di tosse nei bambini al di sotto dei 2 anni, è opportuno che un medico ne accerti la causa. Perciò, si sconsiglia l'impiego di questo preparato nei bambini al di sotto dei 2 anni senza aver consultato un medico.
- Informi il suo medico, farmacista o droghiere se
 - soffre di altre malattie,
 - ha qualche allergia oppure,
 - prende altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Come usare SIMILASAN tosse irritativa?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

Neonati, bambini e adulti: 7 globuli per ogni somministrazione.

- Disturbi acuti: Ogni quarto d'ora. Diminuire la frequenza non appena sopraggiunge un miglioramento.
- Per la completa guarigione: 3–6 volte al giorno.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che il medicamento agisca troppo o troppo poco, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN tosse irritativa?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN tosse irritativa. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico, farmacista o droghiere.

L'assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano:

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Prendere in una volta sola 7 globuli e aspettare l'effetto.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo «Come usare ...».

Qualora il peggioramento dovesse persistere, interrompere l'assunzione di SIMILASAN tosse irritativa e consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Senza zucchero. Con xilitolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il preparato può essere somministrato solo fino alla data <Exp.> indicata sulla confezione.
- Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal medico, dal farmacista o dal droghiere.

Cosa contiene SIMILASAN tosse irritativa?

Globuli contengono: Drosera D3 60 %, D6 20 %, D12 20 %.

Il preparato contiene come eccipienti:

xilito e carbonato di calcio.

Numero dell'omologazione:

51340 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN tosse irritativa? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia da viaggio e della farmacia tascabile)

Titolare dell'autorizzazione:

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Questo foglio illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel febbraio 2009 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).