



Taschen-Apotheke

Homöopathische Arzneimittel

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
- Arnica plus	4	- Hautausschläge	10
- Fieber und Grippe Nr. 1 (Frieren und Hitze im Wechsel, Gliederschmerzen)	5	- Husten mit Verschleimung	11
- Fieber und Grippe Nr. 2 (Starkes Schwitzen und Unruhe)	6	- Magen-Darm-Beschwerden	12
- Fliess-Schnupfen	7	- Milchbildung	13
- Halsentzündungen	8	- Nervöse Bauchkrämpfe	14
- Hämorrhoiden	9	- Reizhusten	15
		- Schlafstörungen	16
		- Venenbeschwerden	17
		- Verstopfung	18
		- Zahnungs-Beschwerden	19

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Diese Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben sie ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen.

Wenden Sie die Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Allgemeine Hinweise

Einnahmehinweise:

- Globuli (Kügelchen) im Mund zergehen lassen.
- Dürfen auch auf nüchternen Magen eingenommen werden.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Einnahme des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung.

Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen können die homöopathischen Arzneimittel der SIMILASAN Taschen-Apotheke haben?

Für die homöopathischen Arzneimittel der SIMILASAN Taschen-Apotheke sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Massnahmen bei anfänglicher Symptomverstärkung:

1. Präparat nicht mehr einnehmen bis die Reaktion abgeklungen ist.
2. Einmal 7 Globuli einnehmen. Wirkung abwarten.
3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.
4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfehlungen unter „Wie verwenden Sie ...“ einhalten.

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie das entsprechende homöopathische Arzneimittel ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

- Zuckerfrei. Mit Xylit.
- Vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Die Arzneimittel dürfen nur bis zu dem auf den Behältern mit <Exp.> bezeichneten Datum verwendet werden.
- Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Wo erhalten Sie die homöopathischen SIMILASAN Arzneimittel?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Welche Packungen sind erhältlich?

Packungsgrößen: 15 g / 4,5 g (nur als Bestandteil der Taschen-Apotheke)

Zulassungsinhaberin und Herstellerin:

Similasan AG, CH-8916 Jönen

Arnica plus Globuli

Globuli

Wann wird *Similasan Arnica plus Globuli* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *Similasan Arnica plus Globuli* angewendet werden bei:

- Verstauchungen, Verrenkungen, Quetschungen, Prellungen
- Blutergüssen
- Weichteilverletzungen (Schnitt- und Stichwunden)
- Muskelschmerzen (Muskelkater)
- Brandwunden, Sonnenbrand
- Beschwerden nach Operationen (Wundschmerzen)
- Beschwerden nach Knochenbrüchen

Was sollte dazu beachtet werden?

- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *Similasan Arnica plus Globuli* gleichzeitig eingenommen werden darf.
- Grossflächige, stark verschmutzte und tiefe Wunden, sowie Biss- und Stichwunden benötigen eine ärztliche Behandlung (Gefahr von Wundstarrkrampf). Bleibt der Umfang einer Wunde während einiger Zeit unverändert gross oder verheilt die Wunde nicht innerhalb von 7 Tagen ist ebenfalls ein Arztbesuch erforderlich. Ebenso, wenn die Wundränder stark gerötet sind, die Wunde plötzlich anschwillt, stark schmerzhaft ist oder die Verletzung von Fieber begleitet wird (Gefahr einer Blutvergiftung).

Wann darf *Similasan Arnica plus Globuli* nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Verschlechtert sich das Allgemeinbefinden (z. B. Fieber) ist unverzüglich ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie *SIMILASAN Arnica plus Globuli*?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kleinkinder, Kinder und Erwachsene:
7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- **Akute Beschwerden:** 6 mal täglich. Bei starken Schmerzen auch häufiger (bis halbstündlich).
- **Zum Ausheilen:** 3 mal täglich.

Was ist in *Similasan Arnica plus Globuli* enthalten?

Globuli enthalten: Arnica montana D4 / Calendula officinalis D4 / Hypericum perforatum D4 / Symphytum D6 zu gleichen Teilen. Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 51'362 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Fieber und Grippe Nr.1

Globuli

Wann wird *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr.1* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr.1* angewendet werden bei:

- Beginnenden oder akuten Erkältungskrankheiten mit Fieber und Husten
- Grippe und Erkältung mit Gliederschmerzen und grosser Müdigkeit
- Grippe und Erkältung mit Frieren und Frösteln, abwechselnd mit Hitzewallungen
- Grippe und Erkältung mit gestauter Hitze und Druckgefühl im Kopf bei gerötetem Gesicht (heisse Stirn und Wangen)

Was sollte dazu beachtet werden?

- Bei hohem Fieber oder bei Verschlechterung des Zustandes ist die frühzeitige Konsultation des Arztes angezeigt.
- Es ist empfehlenswert, das Präparat möglichst frühzeitig, d. h. bei den ersten Anzeichen einer Erkältung (Gliederschmerzen, Frieren und Hitze, Müdigkeit) einzusetzen.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr.1* gleichzeitig eingenommen werden darf.
- Bei andauernder Verschlechterung oder fehlender Besserung ist Ihr Arzt oder Ärztin aufzusuchen.

Wann darf *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr.1* nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr.1*?

Falls vom Arzt oder von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kleinkinder, Kinder und Erwachsene:
7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- **Bei ersten Anzeichen einer Grippe oder Erkältung:** 3 - 6 mal täglich.
- **Akute Beschwerden:** Halbstündlich. Mit zunehmender Besserung weniger häufig.
- **Zum Ausheilen:** 3 mal täglich.

Was ist in *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr.1* enthalten?

Globuli enthalten: Ferrum phosphoricum D6 60% / D8 20% / D12 20%. Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat

Zulassungsnummer: 53'322 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Fieber und Grippe Nr. 2

Globuli

Wann wird *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr. 2* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr. 2* angewendet werden bei Grippe und Erkältungskrankheiten mit:

- Starken Schweissen oder Hitzestau (trockener Hitze), Fieber (periodisch und plötzlich auftretend), Schüttelfrösten
- Allgemeiner Gereiztheit und Unruhe
- Kopfschmerzen (klopfend, mit Blutandrang)
- Trockenem, schmerzhaftem Hals (Schluckreiz, Zusammenschnürungsgefühl) und trockenem, bellendem Husten

Was sollte dazu beachtet werden?

- Bei hohem Fieber oder bei Verschlechterung des Zustandes ist die frühzeitige Konsultation des Arztes oder der Ärztin angezeigt.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr. 2* gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr. 2* nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Höheres Fieber und Halsschmerzen bei Kindern unter 2 Jahren müssen ärztlich abgeklärt werden. Daher soll das Präparat in dieser Altersgruppe ohne ärztliche Abklärung nicht angewendet werden.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr. 2* ?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:
Kinder und Erwachsene: 7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- **Akute Beschwerden:** Halbstündlich.
Mit zunehmender Besserung weniger häufig.
- **Zum Ausheilen:** 3 mal täglich.

Was ist in *SIMILASAN Fieber und Grippe Nr. 2* enthalten?

Globuli enthalten: Belladonna (Atropa bella-donna) D6 70% / D12 30%.
Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 50'866 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Fliess-Schnupfen

Globuli

Wann wird *Similasan Fliess-Schnupfen* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *Similasan Fliess-Schnupfen* angewendet werden bei:

- Erkältungsschnupfen, allergischem Schnupfen, Heuschnupfen und nervösem Schnupfen mit reichlicher, wundmachender, wässriger Absonderung
- Triefendem Schnupfen mit Tränenfluss, wunden Nasenlöchern

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *Similasan Fliess-Schnupfen* gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf *Similasan Fliess-Schnupfen* nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

- Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.
- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,

- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie *Similasan Fliess-Schnupfen* ?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:
Kleinkinder, Kinder und Erwachsene:
7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- **Akute Beschwerden:** Viertel- oder halbstündlich.
Mit zunehmender Besserung weniger häufig.
- **Zum Ausheilen:** 3 mal täglich.

Was ist in *Similasan Fliess-Schnupfen* enthalten?

Globuli enthalten:
Allium cepa D4 85% / D10 10% / D15 5%.
Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 50'672 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.



Halsentzündungen

Globuli

Wann wird *Similasan Halsentzündungen* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *Similasan Halsentzündungen* angewendet werden bei:

- Akuten und chronischen, schmerzhaften Halsentzündungen

Was sollte dazu beachtet werden?

- Bei höherem Fieber oder wenn innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, ist ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *Similasan Halsentzündungen* gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf *Similasan Halsentzündungen* nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

- Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.
- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,

- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie *Similasan Halsentzündungen*?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene:

7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- **Akute Beschwerden:** Mehrmals täglich (bis stündlich).
- **Zum Ausheilen:** 3 mal täglich.

Was ist in *Similasan Halsentzündungen* enthalten?

Globuli enthalten: Apis mellifica D10 / Belladonna (Atropa bella-donna) D8 / Lachesis D12 / Mercurius bijodatus (Hydrargyrum biiodatum) D12 zu gleichen Teilen.

Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 50'937 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.



Hämorrhoiden

Globuli

Wann wird *SIMILASAN Hämorrhoiden* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *SIMILASAN Hämorrhoiden* angewendet werden bei:

- Äusseren (Knötchen) und inneren Hämorrhoiden
- Hämorrhoidalbeschwerden mit Juckreiz, Brennschmerz, stechenden und krampfartigen Schmerzen
- Leichten Hämorrhoidalblutungen (helles Blut)
- Wundheit und Entzündungen am After

Was sollte dazu beachtet werden?

- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *SIMILASAN Hämorrhoiden* gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf *SIMILASAN Hämorrhoiden* nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Bei erstmaligem Auftreten der Beschwerden darf die Selbstbehandlung nicht länger als 2 Wochen dauern. Zur Abklärung ist ein(e) Arzt/Ärztin zu konsultieren.
- Wiederholte Behandlungen dürfen nur nach einer ärztlich gesicherten Diagnose erfolgen.
- Bei Blutabgang, sich wiederholenden Blutungen, oder bei Verdacht auf Blut im Stuhl sowie bei gleichzeitigem Auftreten von Schmerzen am After und Fieber ist zur Abklärung ein(e) Arzt/Ärztin zu konsultieren.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie *SIMILASAN Hämorrhoiden*?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben:

Jugendliche und Erwachsene: 7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe. Für Kinder nicht geeignet.

- **Akute Beschwerden:** 6 mal täglich.
- **Zum Ausheilen:** 3 mal täglich.

Was ist in *SIMILASAN Hämorrhoiden* enthalten?

Globuli enthalten: Acidum nitricum D10 / Capsicum annum D10 / Graphites D8 / Hamamelis virginiana D8 zu gleichen Teilen.

Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 53'359 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Hautausschläge

Globuli

Wann wird **SIMILASAN Hautausschläge** angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann **SIMILASAN Hautausschläge** angewendet werden bei Hautausschlägen und Ekzemen wie:

- Trockene, schuppende und nässende Hautausschläge und Ekzeme
- Entzündliche Hautflecken und Hautausschläge mit Rötung
- Nesselausschlag (Urtikaria), Quaddeln
- Bläschenausschläge

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob **SIMILASAN Hautausschläge** gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf **SIMILASAN Hautausschläge** nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Bei Kindern unter 2 Jahren Arzt oder Apotheker, bzw. Ärztin oder Apothekerin konsultieren.
- Bei grossflächigen Hautveränderungen, Infektionen und Verdacht auf systemische Krankheiten sollte ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werden.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie **SIMILASAN Hautausschläge** ?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kleinkinder, Kinder und Erwachsene:
3 mal täglich 7 Globuli (Kügelchen).

Was ist in **SIMILASAN Hautausschläge** enthalten?

Globuli enthalten: Mercurius solubilis Hahnemanni D12 / Natrium muriaticum (Natrium chloratum) D12 / Rhus toxicodendron D10 / Selenium D15 zu gleichen Teilen.

Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 50'884 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Husten mit Verschleimung

Globuli

Wann wird **Similasan Husten mit Verschleimung** angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann **Similasan Husten mit Verschleimung** angewendet werden bei:

- Trockenem, hackendem Husten mit Verschleimung
- Akutem und chronischem Bronchialhusten mit zähem, festsitzendem Schleim
- Verschleimung des Bronchialbereiches mit erschwertem Abhusten zähen Schleimes (besonders morgens)
- Chronischen Bronchialkatarrhen betagter Leute

Was sollte dazu beachtet werden?

- Bei starkem Husten, der länger als 7 Tage anhält, muss ein(e) Arzt/Ärztin oder ein(e) Apotheker/in beigezogen werden.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob **Similasan Husten mit Verschleimung** gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf **Similasan Husten mit Verschleimung** nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

- Husten bei Kindern unter 2 Jahren soll ärztlich abgeklärt werden. Deshalb soll das Präparat bei Kindern unter 2 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Wie verwenden Sie **SIMILASAN Husten mit Verschleimung** ?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kleinkinder, Kinder und Erwachsene:
7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- **Akute Beschwerden:** Mehrmals täglich (bis stündlich).
- **Zum Ausheilen:** 3 - 6 mal täglich.

Was ist in **Similasan Husten mit Verschleimung** enthalten?

Globuli enthalten: Antimonium sulfuraturn aurantiacum (Stibium sulfuraturn aurantiacum) D12 / Kalium iodatum D12 / Senega (Polygala senega) D8 zu gleichen Teilen. Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 51'341 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Magen-Darm-Beschwerden

Globuli

Wann wird *Similasan Magen-Darm-Beschwerden* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *Similasan Magen-Darm-Beschwerden* angewendet werden bei:

- **Magen-Darm-Entzündungen mit:** Übelkeit, Erbrechen, Durchfall; krampfartigen Schmerzen (Koliken); Appetitlosigkeit und Abneigung gegen Speisen; Erschöpfungszuständen und Unruhe; Aufstossen, aufgetriebenem, berührungsempfindlichem Bauch
- **Akuten Magen-Darm-Katarrhen mit:** Stark stinkendem, schleimigem oder wässrigem, wundmachendem Durchfall; Krämpfen und StuhlDrang; Erbrechen
- **Magen-Darm-Beschwerden nach Genuss von:** Kalten Getränken und Speisen (Eis); sauren Speisen, Obst und anderen wässrigen Früchten; schlecht verträglichen Speisen

Was sollte dazu beachtet werden?

- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *Similasan Magen-Darm-Beschwerden* gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf *Similasan Magen-Darm-Beschwerden* nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren sind ärztlich abzuklären. Deshalb soll das Präparat bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Wie verwenden Sie *SIMILASAN Magen-Darm-Beschwerden* ?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben: Kinder und Erwachsene:

7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- **Akute Beschwerden:** Viertel- oder halbstündlich. Mit zunehmender Besserung weniger häufig.
- **Leichte Beschwerden und zum Ausheilen:** 3 - 6 mal täglich.

Was ist in *Similasan Magen-Darm-Beschwerden* enthalten?

Globuli enthalten: Arsenicum album (Acidum arsenicosum) D6 / Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) D6 / Mercurius sublimatus corrosivus (Hydrargyrum bichloratum) D6 / Podophyllum peltatum D6 zu gleichen Teilen.

Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 50'868 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Milchbildung

Globuli

Wann wird *SIMILASAN Milchbildung* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *SIMILASAN Milchbildung* angewendet werden bei:

- Milchmangel der Stillenden und zur Förderung des Milchflusses

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *SIMILASAN Milchbildung* gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf *SIMILASAN Milchbildung* nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

- Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.
- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie *SIMILASAN Milchbildung* ?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

- **Markanter Milchmangel, sehr spärlicher Milchfluss:** 6 mal täglich 7 Globuli
- **Optimierung und Aufrechterhaltung der Milchmenge:** 2 - 3 mal täglich 7 Globuli

Was ist in *SIMILASAN Milchbildung* enthalten?

Globuli enthalten: Alfalfa D6 / Lac caninum D10 / Urtica urens D6 zu gleichen Teilen. Das Präparat enthält als Hilfsstoffe Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 54'925 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Nervöse Bauchkrämpfe

Globuli

Wann wird **SIMILASAN Nervöse Bauchkrämpfe angewendet?**

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann **SIMILASAN Nervöse Bauchkrämpfe** angewendet werden bei:

- Magen-Darmkrämpfen infolge Nervosität oder seelischer Belastung
- Nervösen Verdauungsbeschwerden mit Blähungen und krampfhaften, kolikartigen Schmerzen
- Gallenweg- und Gallenblasenkrämpfen

Was sollte dazu beachtet werden?

- Bei andauernder Verschlechterung, hohem Fieber oder wenn innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, ist Ihr(e) Arzt/Ärztin aufzusuchen.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob **SIMILASAN Nervöse Bauchkrämpfe** gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf **SIMILASAN Nervöse Bauchkrämpfe nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?**

- Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren sind ärztlich abzuklären. Deshalb soll das Präparat bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden.
- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,

- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Wie verwenden Sie **SIMILASAN Nervöse Bauchkrämpfe**?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben: Kleinkinder, Kinder und Erwachsene:

7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- **Akute Beschwerden:** Viertel- oder halbstündlich. Mit zunehmender Besserung allmählich weniger häufig.
- **Zum Ausheilen:** 3 mal täglich, bis zur vollständigen Beschwerdefreiheit.

Was ist in **SIMILASAN Nervöse Bauchkrämpfe** enthalten?

Globuli enthalten: Anamirta cocculus D15 / Belladonna (Atropa bella-donna) D12 / Chamomilla recutita D12 / Colocynthis D12 / Magnesium phosphoricum D12 zu gleichen Teilen.

Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 52'311 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Reizhusten

Globuli

Wann wird **Similasan Reizhusten** angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann **Similasan Reizhusten** angewendet werden bei:

- Trockenem Husten mit Schmerzen hinter dem Brustbein
- Reizhusten, Kitzelhusten mit Brechreiz
- Hustenanfällen (besonders nachts)

Was sollte dazu beachtet werden?

- Bei starkem Husten, der länger als 7 Tage anhält, muss ein(e) Arzt/Ärztin oder ein(e) Apotheker/in beigezogen werden.
- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob **Similasan Reizhusten** gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf **Similasan Reizhusten nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?**

- Husten bei Kindern unter 2 Jahren soll ärztlich abgeklärt werden. Deshalb soll das Präparat bei Kindern unter 2 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie **SIMILASAN Reizhusten**?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kleinkinder, Kinder und Erwachsene:
7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- **Akute Beschwerden:** Viertelstündlich. Mit zunehmender Besserung weniger häufig.
- **Zum Ausheilen:** 3 - 6 mal täglich.

Was ist in **SIMILASAN Reizhusten** enthalten?

Globuli enthalten:

Drosera D3 60% / D6 20% / D12 20%.
Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 51'340 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Schlafstörungen

Globuli

Wann wird *Similasan Schlafstörungen* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *Similasan Schlafstörungen* angewendet werden bei:

- Einschlaf- und Durchschlafstörungen (häufiges Erwachen)
- Durch Gedankenfluss, Verspannungen und Unruhe gestörten Schlaf
- Unruhigem, oberflächlichem, traumreichem Schlaf

Was sollte dazu beachtet werden?

- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *Similasan Schlafstörungen* gleichzeitig eingenommen werden darf.
- Bei Anhalten der Beschwerden über einen Monat soll ärztliche Hilfe beansprucht werden.
- Da Schlafstörungen verschiedenste Ursachen haben können, ist der Wirkungseintritt bei Einnahme dieses Präparates von Person zu Person verschieden. Hartnäckige, chronische Schlaflosigkeit bedarf meist einer längeren Behandlungszeit.

Wann darf *Similasan Schlafstörungen* nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

- Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt.
- Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden,
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie *Similasan Schlafstörungen* ?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben: Kleinkinder, Kinder und Erwachsene: 7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- **Gelegentliche Schlafstörungen:** Abends vor dem Zubettgehen. Bei ausbleibendem Soforterfolg, viertelstündlich wiederholen. Bei häufigem Erwachen auch nachts.
- **Chronische Schlafstörungen:** Morgens, mittags und abends vor dem Zubettgehen. Bei häufigem Erwachen auch nachts.

Was ist in *Similasan Schlafstörungen* enthalten?

Globuli enthalten: Avena sativa D12 / Hepar sulfuris D12 / Pulsatilla pratensis D15 / Zincum valerianicum (Zincum isovalerianicum) D12 zu gleichen Teilen. Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 51'360 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Venenbeschwerden

Globuli

Wann wird *SIMILASAN Venenbeschwerden* angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann *SIMILASAN Venenbeschwerden* angewendet werden bei:

- Schmerzhaften, zu Entzündungen neigenden Venen und Krampfadern
- Müdigkeit, Schwere, Spannen in den Beinen
- Waden- und Beinkrämpfen
- Hitzegefühle oder Kälte in den Beinen
- Venösen Stauungen mit Schwellungen (Ödeme)

Was sollte dazu beachtet werden?

- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Medikamente verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob *SIMILASAN Venenbeschwerden* gleichzeitig eingenommen werden darf.
- Bei andauernder Verschlechterung oder fehlender Besserung ist Ihr Arzt oder Ihre Ärztin aufzusuchen.
- Zusätzlich zur medikamentösen Therapie sollte für ausreichende Bewegung (Schwimmen, Wandern) gesorgt und langes Stehen vermieden werden. Die Beine nachts etwas hochlagern.

Wann darf *SIMILASAN Venenbeschwerden* nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie *SIMILASAN Venenbeschwerden* ?

Falls vom Arzt oder von der Ärztin nicht anders verschrieben:

- Erwachsene: 7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.
- **Akute Beschwerden:** 6 mal täglich.
- **Zum Ausheilen:** 3 mal täglich.

Was ist in *SIMILASAN Venenbeschwerden* enthalten?

Globuli enthalten: Aesculus hippocastanum D8 / Aristolochia clematitis D10 / Lycopodium clavatum D12 / Vipera berus D12 zu gleichen Teilen. Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 53'360 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Verstopfung

Globuli

Wann wird **SIMILASAN Verstopfung** angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann **SIMILASAN Verstopfung** angewendet werden bei:

- Verstopfung (krampfhafter, chronischer)
- Darmträgheit, hartem Stuhl

Was sollte dazu beachtet werden?

- Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob **SIMILASAN Verstopfung** gleichzeitig eingenommen werden darf.
- Bei hartnäckiger oder chronischer Verstopfung ist ein Erfolg oft erst nach 4 - 6 Wochen Behandlungszeit zu erwarten.
- Es ist wichtig, bei Verstopfung viel Flüssigkeit und ballaststoffreiche Nahrung (Gemüse, Früchte, Vollkornbrot) zu sich zu nehmen und auf körperliche Betätigung (Sport) zu achten.
- Bei andauernder Verschlechterung oder fehlender Besserung ist Ihr Arzt oder Ihre Ärztin aufzusuchen.

Wann darf **SIMILASAN Verstopfung** nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren sind ärztlich abzuklären. Deshalb soll das Präparat bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden.

- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie **SIMILASAN Verstopfung** ?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

Kleinkinder, Kinder und Erwachsene:

7 Globuli (Kügelchen) pro Gabe.

- **Akute Beschwerden:** 3 mal täglich.

- **Zum Ausheilen:** 1 mal täglich (morgens oder abends).

Was ist in **SIMILASAN Verstopfung** enthalten?

Globuli enthalten: Graphites D12 / Magnesium chloratum D8 / Sulfur D15 / Thuja occidentalis D10 zu gleichen Teilen.

Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 51'373 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Zahnungs-Beschwerden

Globuli

Wann wird **SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden** angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann **SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden** angewendet werden bei:

- Erschwernem, verzögertem Zahnen
- Zahnungsbeschwerden mit:
 - starkem Speichelfluss und Drang zum Beissen
 - Durchfall
- Gereiztheit, Unruhe, Schmerzen beim Zahnen

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob **SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden** gleichzeitig eingenommen werden darf.

Wann darf **SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden** nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.
- Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie
 - an andern Krankheiten leiden
 - Allergien haben oder
 - andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen.

Wie verwenden Sie **SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden** ?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:

- **Bei beginnender Zahnung:** 3 mal täglich 7 Globuli (Kügelchen).
- **Akute Zahnungsbeschwerden:** Viertelstündlich 7 Globuli (Kügelchen), bis zur vollständigen Beschwerdefreiheit.

Was ist in **SIMILASAN Zahnungs-Beschwerden** enthalten?

Globuli enthalten: Calcium carbonicum Hahnemanni D12 / Calcium fluoratum D12 / Calcium phosphoricum D12 / Chamomilla recutita D8 / Ferrum phosphoricum D12 / Podophyllum peltatum D12 zu gleichen Teilen. Das Präparat enthält als Hilfsstoffe: Xylit und Calciumcarbonat.

Zulassungsnummer: 47'659 (Swissmedic)

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2009 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.