

Überanstrengte Augen

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, Apothekerin oder Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Wann wird SIMILASAN Überanstrengte Augen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann SIMILASAN Überanstrengte Augen angewendet werden:

- unterstützend bei intensiver Beanspruchung der Augen
- bei überanstrengten, tränenden Augen

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob SIMILASAN Überanstrengte Augen gleichzeitig angewendet werden darf.

Bei Augenbeschwerden ist das Tragen von Kontaktlinsen nicht angezeigt. Wenn Sie jedoch auf Kontaktlinsen angewiesen sind, entfernen Sie diese vor dem Eintropfen und setzen Sie die Linsen frühestens 15 Minuten nach der Behandlung wieder ein. Empfehlenswert ist die Anwendung auch nach dem Entfernen der Linsen, abends vor dem Schlafengehen und morgens beim Erwachen, mind. 15 Min. vor dem Einsetzen der Linsen.

Beachten Sie, dass ein symptomatisches Auge gegenüber Linsen empfindlicher reagiert. Wenn nach 2–3 Tagen keine Besserung eingetreten ist, ist ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Kommt es zu einer Verschlechterung oder treten neue Symptome auf, z.B. eine Abnahme der Sehschärfe oder Schmerzen, ist unverzüglich ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wann darf SIMILASAN Überanstrengte Augen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

- Bei Kindern unter 6 Jahren nur auf ärztliche Verschreibung hin anwenden.
- Bei Linsentrübungen (Grauer Star, Katarakt) oder Grünem Star (Glaukom) nur nach ärztlicher Diagnose anwenden.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten

bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen oder anwenden.

Darf SIMILASAN Überanstrengte Augen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?


Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. die Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie SIMILASAN Überanstrengte Augen?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben:
Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:
• Ein bis mehrere Male pro Tag 1–2 Tropfen pro Auge.

Anwendung:

- Einen Tropfenbehälter abtrennen und Flüssigkeit zur Kugelspitze schütteln. Flachen Teil mit Kugelspitze durch eine Drehbewegung vom Tropfenbehälter abtrennen.
- Augentropfenbehälter mit Zeigefinger und Daumen mit der Spitze nach unten über das offene Auge halten, zusammenpressen und Tropfen ins Auge träufeln.
- Für jede Anwendung einen neuen Augentropfenbehälter verwenden (nicht haltbar, da ohne Konservierungsmittel).



Die Wirkdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Grundsätzlich wird die Anwendung des Präparates bei Nachlassen der Wirkung oder bei Rückkehr der Beschwerden wiederholt.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung.

Wenn bei der Behandlung eines Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer

Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann SIMILASAN Überanstrengte Augen haben?

Für SIMILASAN Überanstrengte Augen sind bisher bei bestimmungsgemässen Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Massnahmen im Falle von anfänglicher Symptomverstärkung (Erstverschlimmerung):

1. Präparat nicht mehr anwenden bis die Reaktion abgeklungen ist.
2. Einmal 1 Tropfen in ein Auge träufeln. Wirkung abwarten.
3. Bei Wiederholung der Reaktion gleiches Verhalten wie unter 1. und 2. beschrieben.
4. Wird keine Reaktion mehr verspürt, die Empfehlungen unter "Wie verwenden Sie ..." einhalten.

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie SIMILASAN Überanstrengte Augen ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

- Angebrochene Augentropfenbehälter sofort verwenden und nach Gebrauch wegwerfen (nicht haltbar, da ohne Konservierungsmittel).
- Ausser Reichweite von Kindern lagern.
- Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit <EXP.> bezeichneten Datum verwendet werden.
- Bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in SIMILASAN Überanstrengte Augen enthalten?

1 g Tropflösung enthält: Senecio cineraria (Cineraria maritima) D6 / Natrium chloratum D6 / Ruta graveolens D6 zu gleichen Teilen 303 mg. Excipients ad solutionem pro 1 g

Zulassungsnummer

60378 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie SIMILASAN Überanstrengte Augen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

- Packung mit 20 Monodosen zu 0,40 ml
- Fläschchen zu 10 ml (mit Konservierungsmittel).

Zulassungsinhaber

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Diese Packungsbeilage wurde im Februar 2018 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Yeux surmenés

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Quand SIMILASAN Yeux surmenés est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique SIMILASAN Yeux surmenés peut être utilisé:

- Appoint en cas de sollicitation intense des yeux
- En cas d'yeux surmenés et larmoyants

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si SIMILASAN Yeux surmenés peut être utilisé simultanément.

En cas de troubles oculaires, il n'est pas recommandé de porter des verres de contact. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous en passer, retirez-les avant de mettre les gouttes et remplacez vos verres de contact au plus tôt 15 minutes après le traitement. L'utilisation est aussi recommandée après le retrait des lentilles le soir avant le coucher, ainsi que le matin au réveil au moins 15 min. avant de mettre les lentilles.

N'oubliez pas qu'un œil symptomatique réagira de manière beaucoup plus sensible aux verres de contact. Si aucune amélioration ne devait intervenir après 2 à 3 jours, il est recommandé de consulter un médecin. Si l'état devait même se détériorer ou si de nouveaux symptômes devaient apparaître, p.ex. baisse de l'acuité visuelle ou des douleurs, il y aurait lieu de consulter immédiatement un médecin.

Quand SIMILASAN Yeux surmenés ne doit-il pas être utilisé ou seulement avec précaution?

- Utiliser que sur prescription médicale chez les enfants de moins de 6 ans.
- En cas d'opacité du cristallin (cataracte) ou de glaucome, n'utiliser qu'après consultation médicale.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, si vous souffrez d'une autre

maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!) en usage interne ou externe (même en automédication).

SIMILASAN Yeux surmenés peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné.


Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser SIMILASAN Yeux surmenés?

Sauf prescription contraire du médecin:
Adultes et enfants à partir de 6 ans:
• 1–2 gouttes par œil, une à plusieurs fois par jour.

Application:

- Détacher une monodose et l'agiter pour faire descendre le liquide vers la pointe arrondie. Tordre la partie plate avec la pointe arrondie pour la détacher de la monodose.
- Tenir la monodose entre le pouce et l'index avec la pointe tournée vers le bas juste au-dessus de l'œil ouvert; presser pour verser le liquide goutte à goutte dans l'œil.
- Utiliser une nouvelle monodose à chaque application (ne se conserve pas, car ne contient pas de conservateur).



Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou les troubles reviennent. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrire par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires SIMILASAN Yeux surmenés peut-il provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale).

Mesures en cas d'aggravation des symptômes au début du traitement (aggravation initiale):

1. Suspendre l'administration de la préparation jusqu'à ce que la réaction thérapeutique ait cessé.
2. Faire tomber une goutte dans un œil. Attendre l'effet.
3. Si la réaction se répète, agir comme indiqué sous points 1. et 2.
4. Si vous ne ressentez aucune réaction, respectez les recommandations mentionnées sous „Comment utiliser ...“.

Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec SIMILASAN Yeux surmenés et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

- Utiliser aussitôt les monodoses ouvertes et les jeter après application (ne se conserve pas, car ne contient pas de conservateur).
- Conservez hors de portée des enfants.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP.> sur le récipient.
- Conserver à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient SIMILASAN Yeux surmenés?

1 g de solution contient: Senecio cineraria (Cineraria maritima) D6 / Natrium chloratum D6 / Ruta graveolens D6 à parts égales 303 mg. Excipients ad solutionem pro 1 g

Numéro d'autorisation

60378 (Swissmedic)

Où obtenez-vous SIMILASAN Yeux surmenés? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

- Emballage de 20 doses individuelles de 0,40 ml
- Flacon de 10 ml (avec agent conservateur)

Titulaire de l'autorisation

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2018 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Occhi affaticati

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Quando si usa SIMILASAN Occhi affaticati?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici SIMILASAN Occhi affaticati può essere usato:

- Come coadiuvante in caso di intense sollecitazioni agli occhi
- In caso di occhi affaticati e lacrimanti

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chiedi al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare SIMILASAN Occhi affaticati.

Si sconsiglia di portare le lenti a contatto in caso di disturbi agli occhi. Qualora tuttavia non si possa far a meno delle lenti a contatto, toglierle prima di istillare il collirio e rimettere non prima che siano trascorsi almeno 15 minuti dall'istillazione. Si consiglia l'uso anche dopo aver tolto le lenti, di sera prima di andare a dormire e di mattina al risveglio, almeno 15 minuti prima di mettere le lenti.

Si tenga presente che quando l'occhio è sintomatico reagisce alle lenti con maggiore sensibilità. Rivolgersi ad un medico se non si osserva alcun miglioramento apprezzabile nel giro di 2-3 giorni. Consultare immediatamente il medico qualora si noti un peggioramento o la comparsa di nuovi sintomi, per es. una diminuzione dell'acuità visiva o dolori.

Quando non si può usare SIMILASAN Occhi affaticati e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

- Nei bambini sotto i 6 anni, usare solo su prescrizione medica.
- In caso di offuscamento del cristallino (cataratta) o glaucoma, usare soltanto dopo la diagnosi medica.

Informi il suo medico, farmacista o il suo droghiere nel caso in cui, soffre di altre malattie, soffre di allergie o applica esternamente altri medicamenti

(anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare SIMILASAN Occhi affaticati durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.


Come usare SIMILASAN Occhi affaticati?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia:

- Adulti e bambini dai 6 anni:
- Da una a più volte il giorno, 1-2 gocce in ogni occhio.

Applicazione:

- Staccare un flaconcino e scuoterlo, per far confluire il liquido verso la punta arrotondata. Levare la parte piatta con punta arrotondata con un movimento rotatorio.
- Tenere in flacone sopra l'occhio con la punta rivolta verso il basso, indipendere leggermente per far fuoriuscire le gocce.
- Cambiare flaconcino per ogni nuova applicazione (non conservabile, perché privo di conservanti).



La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere l'uso del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.

Se il trattamento riguarda un bambino e non si ottiene il miglioramento desiderato, il bambino deve essere visitato da un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere SIMILASAN Occhi affaticati?

Non sono stati finora osservati effetti collaterali

in seguito all'impiego corretto di SIMILASAN Occhi affaticati. Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, farmacista o il suo droghiere.

Con l'assunzione di medicamenti omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale).

Cosa fare quando i sintomi si acutizzano (peggioramento iniziale):

1. Interrompere la somministrazione fino a quando la reazione si affievolisce.
2. Istillare in una volta sola 1 goccia in 1 occhio e aspettare la reazione.
3. Se la reazione si ripete, comportarsi come descritto ai punti 1. e 2.
4. Se non si avverte più alcuna reazione, attenersi alle raccomandazioni descritte al paragrafo "Come usare ...".

Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con SIMILASAN Occhi affaticati e informi il suo medico, il farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

- Utilizzare subito i flaconcini già aperti e gettarli immediatamente dopo l'uso (non conservabile, perché privo di conservanti).
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con <EXP> sul contenitore.
- Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene SIMILASAN Occhi affaticati?

1 g di soluzione contiene: Senecio cineraria (Cineraria maritima) D6 / Natrium chloratum D6 / Ruta graveolens D6 in parti uguali 303 mg. Excipients ad solutionem pro 1 g

Numero dell'omologazione

60378 (Swissmedic)

Dove è ottenibile SIMILASAN Occhi affaticati? Quali confezioni sono disponibili?

- In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica.
- Confezione con 20 monodose da 0,40 ml
- Flacone da 10 ml (contiene agenti conservanti)

Titolare dell'omologazione

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2018 dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).

Overstrained Eyes

Information for patients

Read this package leaflet carefully since it contains important information. This medicine has either been prescribed for you personally by your doctor, or you have purchased it from a pharmacist or druggist without a medical prescription. In order to obtain the greatest benefit from this medicine, use it according to this package leaflet or as directed by your doctor, pharmacist or druggist. Keep this package leaflet safe, you may want to read it again later.

When should SIMILASAN overstrained eyes be used?

In accordance with homeopathic principles, SIMILASAN Overstrained eyes can be used:

- To provide relief for stressed eyes
- For overstrained, watering eyes

What precautions should be taken?

If your physician has prescribed other medications, please ask him/her or your pharmacist if you may use SIMILASAN Overstrained eyes at the same time.

In cases of eye discomfort, the wearing of contact lenses is not advised.

However, if you are dependent upon contact lenses, remove these before using the eye drops and replace the lenses at the earliest 15 minutes after treatment.

It is also recommended that this product be used after taking out the lenses, in the evening before going to bed, and in the morning upon waking, at least 15 minutes before putting the lenses in.

Please note that symptomatic eyes react more sensitively to contact lenses.

If the eye inflammation does not improve after 2-3 days, consult your doctor.

Should the condition worsen or new symptoms occur, such as blurry vision or pain, consult your doctor immediately.

When must SIMILASAN overstrained eyes not be used or used only with caution?

- For children under the age of 6, use only if prescribed by a doctor.
- If you have cataracts or glaucoma, use only after a medical diagnosis.

Tell your doctor, pharmacist or druggist if you are suffering from any other diseases or illnesses, have allergies or are taking other medicines (even those you have bought yourself) by mouth or

using them externally.

When must SIMILASAN overstrained eyes not be taken during pregnancy or when breast-feeding?

Experience so far shows that there is no known risk to the unborn child when used as recommended. However, systematic scientific studies have never been performed. As a precautionary measure, you are advised to refrain from taking medications during pregnancy and while breast-feeding or to consult your physician, pharmacist or druggist.


How do you use SIMILASAN overstrained eyes?

Unless prescribed differently by your physician: Adults and children 6 years of age and older:

- Drip 1-2 drops in each eye once or several times a day.

Instructions for administration:

- Tear off one eye-drop container and shake the liquid down to the ball tip. Break off the flat part with the ball end from the dropper by twisting it off.
- Grip the eye dropper between the index finger and the thumb with the tip facing downwards, and hold it over the open eye. Squeeze so that drops trickle into the eye.
- Use a fresh eye dropper for every application (preservative-free, therefore perishable).



The period of effectiveness of a medical preparation can vary from person to person.

As a rule, repeat the dose when the effect wears off or the symptoms recur.

Keep to the dosage given in the package leaflet or prescribed by your doctor.

If no improvement is seen in a child, seek the advice of a doctor.

If you think that the medicine is working too little or too strongly, talk to your doctor, pharmacist or druggist.

What side effects can SIMILASAN overstrained eyes have?

To date, no side effects have been noted when

taking SIMILASAN Overstrained eyes according to instructions.

However, please inform your doctor, pharmacist or druggist if you should notice any side effects.

When using homeopathic medication, the symptoms may at first become more pronounced for a short period (initial exacerbation).

Measures to take in the case of initial worsening of symptoms (initial exacerbation):

1. Stop using the preparation until the reaction has ceased.
2. Drip 1 drop in one eye and wait for reaction.
3. If the reaction recurs, proceed as described in 1. and 2. above.
4. If the reaction does not recur, follow the instructions mentioned in "How do you use ...".

Should the worsening of symptoms persist, stop using SIMILASAN Overstrained eyes and inform your physician, pharmacist or druggist.

What should also be taken into consideration?

- After opening, use immediately and dispose of after use (preservative-free, therefore perishable).
- Keep out of the reach of children.
- The medication may only be taken until the expiry date marked <EXP> on the container.
- Store at room temperature (15-25 °C).

Further information can be obtained from your physician, pharmacist or druggist.

What does SIMILASAN overstrained eyes contain?

1 g solution contains: Senecio cineraria (Cineraria maritima) D6 / Natrium chloratum D6 / Ruta graveolens D6 in equal proportions 303 mg. Excipients ad solutionem pro 1 g

Product licence No.:

60378 (Swissmedic)

Where can you obtain SIMILASAN overstrained eyes? How is the preparation presented?

In pharmacies and drugstores, without medical prescription.

- Pack of 20 single-doses of 0.40 ml each
- Bottle of 10 ml (with preservative)

Holder of product licence:

T&S Eye Care Management AG, CH-6060 Sarnen

The latest examination of this package leaflet was carried out in February 2018 by the Swiss Federal Authorities for Medication (Swissmedic).